

سيفايوس

2 جم , 1 جم , 0.5 جم

سيفايوس 0.5 جم بودرة للحقن العضلي والوريدي
سيفايوس 1 جم بودرة للحقن العضلي والوريدي
سيفايوس 2 جم بودرة للحقن الوريدي والتسريب

اقرأ جميع هذه النشرة بعناية قبل البدء في تناول هذا الدواء.

- احتفظ بهذه النشرة. قد تحتاج إلى قراءتها مرة أخرى أثناء تلقيك للعلاج.
- إذا كان لديك أي أسئلة أخرى ، يرجى استشارة الطبيب أو الممرضة.
- تم وصف هذا الدواء لك. لا تنقلها للآخرين. قد يؤذيهم ، حتى لو كانت أعراضهم مماثلة لأعراضك.
- إذا كانت أي من الآثار الجانبية خطيرة ، أو إذا لاحظت أي آثار جانبية غير مدرجة في هذه النشرة ، يرجى إخبار طبيبك أو الصيدلي.

اسم الدواء الخاص بك هو سيفايوس 2 جم و1 جم و0.5 جم مسحوق للحل للحقن أو التسريب. في بقية هذه النشرة يطلق عليه اسم سيفايوس للحقن.

في هذه النشرة:

1. ما هو سيفايوس للحقن وفما يستخدم.
2. قبل استخدام سيفايوس للحقن
3. كيف ينبغي إعطاء سيفايوس للحقن
4. الآثار الجانبية المحتملة
5. كيفية تخزين سيفايوس للحقن
6. مزيد من المعلومات

1. ما هو سيفايوس للحقن وفما يستخدم

ينتمي سيفايوس إلى مجموعة من الأدوية تسمى السيفالوسبورينات وهي المضادات الحيوية. هذه الأدوية تعمل عن طريق قتل البكتيريا التي تسبب الالتهابات.

يستخدم سيفايوس للحقن لعلاج مجموعة من الأمراض البكتيرية الخطيرة بما في ذلك التهابات مجرى الدم (انتان الدم) والعظام (التهاب العظم والنقي) وصمامات القلب (التهاب الغشاء الداخلي) والأغشية التي تغطي الدماغ (التهاب السحايا) وبطانة البطن (التهاب الصفاق) ، ومنع والعلاج من العدوى بعد العمليات الجراحية.

2. قبل إعطاء سيفايوس للحقن

لا ينبغي إعطاء سيفايوس للحقن إذا:

- لديك حساسية من سيفوتاكسيم أو أي سيفالوسبورين آخر.
- سبق أن عانيت من رد فعل تحسسي شديد للبنسلين أو أي مضاد حيوي بيتا لاكتام آخر

إذا كان أي مما سبق ينطبق عليك ، يجب عدم إعطائك سيفايوس للحقن.

توخي الحذر مع سيفايوس للحقن إذا:

- سبق لك أن تعرضت لرد فعل تحسسي للبنسلين أو مضادات حيوية أخرى من هذا النوع. ليس كل الأشخاص الذين لديهم حساسية من البنسلين لديهم أيضاً حساسية من السيفالوسبورين. قبل إعطاؤك هذا الدواء ، يجب على طبيبك التحقق مما إذا كان لديك سابقاً حساسية تجاه هذه الأدوية.
 - لديك مشاكل في الكلى. ستتم مراقبتك بعناية طوال فترة العلاج.
 - أنت على نظام غذائي منخفض الملح ، يجب على طبيبك التأكد من أنك لا تتلقى الكثير من الملح عن طريق حقن سيفايوس.
 - إذا كنت تعالج لمدة تزيد عن 10 أيام ، يجب أن يقوم طبيبك بمراقبة دمك مع تعداد الدم
 - ستقوم بإجراء عملية نقل الدم ، تأكد من أن الطبيب الذي ينظم عملية نقل الدم لديك يعلم أنك مصاب بسيفايوس للحقن.
 - أنت مصاب بالسكري ، قد تحصل على نتائج إيجابية كاذبة مع اختبارات جلوكوز البول ، مثل Clinitest.
 - أنت تطور رد فعل جلدي قاس مثل متلازمة ستيفنز جونسون. قد تشمل الأعراض طفح جلدي ، أو تقرحات في الجلد ، أو حكة أو حكة. يجب عليك التوقف عن العلاج على الفور والاتصال بطبيبك.
 - أنت تأخذ امينوجليكوسيد مثل الستربتومايسين والجنتاميسين. سيتم مراقبة وظيفة الكلى بعناية.
- يجب أن تبقى تحت الملاحظة في حالة إصابة عدوى أخرى ، وخاصة التهاب القولون (عدوى الأمعاء السفلية) ، بينما يتم علاجك باستخدام سيفايوس للحقن.

تناول أدوية أخرى

تناول أدوية أخرى عند إعطاء سيفايوس للحقن يمكن أن يؤثر على عمل هذا الدواء أو غيره. تأكد من أن طبيبك يعرف الأدوية الأخرى التي تتناولها. لا تأخذ أي أدوية أخرى بينما يتم علاجك باستخدام سيفايوس للحقن ما لم تخبر طبيبك أو الصيدلي وطلبت النصيحة. يشمل ذلك الأدوية التي قد اشتريتها بنفسك دون وصفة طبية.

يرجى مراجعة طبيبك إذا كنت تأخذ أيًا مما يلي (أو أي دواء آخر):

- المضادات الحيوية للبنسلين مثل الميزلوسيلين والأزلسيلين
- المضادات الحيوية أمينوغليكوزيد مثل الستربتومايسين ، نيومايسين أو جنتاميسين
- فوروسيميد أو مدرات بول قوية أخرى ، تستخدم للتخلص من الماء الزائد من الجسم
- بروبنسيد ، وتستخدم لمنع النقرس

إذا كان لديك أي شكوك حول ما إذا كان يجب إعطائك هذا الدواء ، تحدث إلى طبيبك.

معلومات مهمة حول بعض مكونات سيفايوس للحقن

سيفايوس للحقن يحتوي على الصوديوم. ليأخذ في الاعتبار النظام الغذائي من الصوديوم للمريض.

الحمل والرضاعة الطبيعية

يجب عليك إبلاغ طبيبك أو ممرضتك إذا كنت حاملاً أو ترغب في الحمل أو الرضاعة الطبيعية قبل تناول هذا الدواء.

القيادة واستخدام الآلات

سيفايوس للحقن قد يسبب الدوخة. إذا كنت متأثراً ، فلا يجب عليك قيادة السيارة أو تشغيل الآلات.

3. كيف يجب إعطاء سيفايوس للحقن

سيقوم الطبيب أو الممرضة بإعداد حقنك عن طريق إذابة مسحوق سيفايوس في سائل مناسب للحقن. وعادة ما يتم حقن الخليط العضلي (في العضلة) أو يعطى عن طريق الوريد (في الوريد) إما عن طريق الحقن أو التسريب (بالتنقيط).

لا ينبغي إعطاء سيفايوس الذي تم حله في محلول يحتوي على حقن ليدوكائين (مخدر موضعي) ، عن طريق الوريد أو للرضع الأقل من 30 شهرًا ، أو للمرضى الذين لديهم حساسية من حقن ليدوكائين ، أو الذين لديهم كتلة قلب (بدون جهاز تنظيم ضربات القلب) ، أو قصور القلب.

الكبار والمسنين

جرعة البالغين المعتادة (بما في ذلك كبار السن) عن طريق الحقن العضلي أو الوريدي هي 1 غرام كل اثنتي عشرة ساعة. يمكن إعطاء جرعات أقل للمرضى الذين يعانون من مشاكل شديدة في الكلى.

الأطفال

الجرعة المعتادة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين شهر واحد واثني عشر عاما هي 100-150 مجم لكل كيلوجرام من وزن الجسم يوميا في جرعتين إلى أربع جرعات مقسمة.

الجرعة المعتادة للرضع الذين تتراوح أعمارهم بين أسبوع واحد إلى أربعة أسابيع هي 50 ملجم لكل كيلوجرام من وزن الجسم في جرعتين أو أربع جرعات مقسمة.

يمكن إعطاء جرعات أعلى ، خاصة في حالات العدوى الشديدة.

سوف يقرر الطبيب الجرعة الأفضل بالنسبة لك. إذا كنت لا تفهم ، أو في أي شك ، اسأل طبيبك أو ممرضتك.

إذا كنت تعتقد أنك قد أعطيت الكثير أو قليل من سيفايوس للحقن

سيحدد الطبيب الجرعة الأفضل بالنسبة لك. إذا كنت تعتقد أن الكثير من الأدوية قد تم إعطاؤها لك ، اتصل بالطبيب أو الممرضة أو الصيدلي أو أقرب مستشفى.

4. الآثار الجانبية المحتملة

مثل العديد من الأدوية ، قد يسبب سيفايوس للحقن آثار جانبية في بعض المرضى ، لا سيما عند بدء العلاج لأول مرة. يجب عليك إبلاغ الطبيب أو الممرضة على الفور إذا كنت على ما يرام.

وتشمل هذه:

- ردود فعل تحسسية مثل الطفح الجلدي ، والحكة ، والحمى ، ونادرا جدا ، وتقشير الجلد ، وتورم في الوجه وصعوبة في التنفس. أخبر طبيبك فورا إذا كنت تعتقد أنك تعاني من حساسية تجاه سيفوتاكسيم.
- الشعور بالمرض ، والمرض ، وآلام المعدة والإسهال ، لا سيما عند إعطائه لأول مرة.
- قد يكون موضع الحقن مؤلما.
- الآثار الجانبية الأخرى التي يعاني منها بعض المرضى سيفايوس للحقن ، خاصة إذا تم إعطاؤهم لفترات طويلة ، تشمل الصداع ، الدوخة ، الأنيميا أو غيرها من التغيرات في الدم (والتي يمكن أن تسبب التهاب الحلق وقرح الفم أو نزف أو كدمات بسهولة) ، تغييرات مؤقتة في وظائف الكبد ، التهاب الكبد ، مشاكل الكلى ، اليرقان ، المفاصل المؤلمة والقلاع.
- من المعروف أن العلاج بجرعات عالية من سيفوتاكسيم ، وخاصة في المرضى الذين يعانون من مشاكل في الكلى ، يسبب فقدان الوعي ، وحركات غير طبيعية وتشنجات.
- في بعض الأحيان ، عانى المرضى من جلطة دموية في الوريد أو عدم انتظام ضربات القلب بعد التسمم الوريدي في الوريد.
- قد يؤدي إعطاء جرعات عالية في المرضى الذين يعانون من مشاكل في الكلى إلى حدوث أمراض في الدماغ.
- يمكن أن يؤثر العلاج بالمضادات الحيوية على البكتيريا الطبيعية في الأمعاء ، مما يسبب عدوى جديدة (التهاب القولون). يجب عليك إخبار طبيبك على الفور إذا كنت تصاب بالإسهال ، أو تقلصات في البطن ، أو ألم ، أو غثيان ، أو جفاف ، أو حمى ، أو إسهال مائي دموي. لا تأخذ أي أدوية مضادة للإسهال ، مثل لميرميد.
- في بعض الأحيان ، إذا كنت تعاني من الحقن في الوريد ، فقد يكون هناك تورم في منطقة العدوى أو التهاب في الوريد.
- الإبلاغ عن الآثار الجانبية

- إذا حصلت على أي آثار جانبية ، تحدث مع طبيبك أو الصيدلي أو الممرضة. يتضمن ذلك أي آثار جانبية محتملة غير مدرجة في هذه النشرة. يمكنك أيضًا الإبلاغ عن الآثار الجانبية مباشرةً عبر أنظمة التقارير الوطنية المدرجة أدناه.
- من خلال الإبلاغ عن الآثار الجانبية ، يمكنك المساعدة في تقديم مزيد من المعلومات حول سلامة هذا الدواء.

5- كيفية تخزين سيفايوس للحقن.

- ابق هذا الدواء بعيدا عن متناول الأطفال.
- يجب عدم استخدام هذا الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية الظاهر على القارورة والكرتون. يشير تاريخ انتهاء الصلاحية إلى آخر يوم في ذلك الشهر.
- يخزن في درجة حرارة لا تزيد عن 30 درجة مئوية .
- بعد الحل : يستخدم خلال 24 ساعة عند درجة حرارة 2-8 درجة مئوية
- [?] ويستخدم بعد التخفيف مباشرة بـ
- 0.9% صوديوم كلوريد
- 5% جلوكوز
- 5محلول % جلوكوز + 0.9 % صوديوم كلوريد
- محلول رنجر لاكتات
- 5محلول % نيترونيدازول
- محلول ديكستروز 40 في 0.9 % صوديوم كلوريد
- محلول ديكستروز 40 في 5 % جلوكوز
- مزيد من المعلومات
- ما سيفايوس للحقن يحتوي
- سيفايوس للحقن يحتوي على سيفوتاكسيم العنصر النشط مثل الصوديوم سيفوتاكسيم. كل قارورة تحتوي على 500 ملغ أو 1 جم أو 2 غرام من سيفوتاكسيم.

العبوة:

سيفايوس 2جم

علبة كرتون تحتوي علي فيال شفاف نوع III به 2096 مجم من البودرة الجافة لعمل 11.4 مي محلول بعد الحل + اثنان امبولة به (5ملي) مياة للحقن

سيفايوس 1 جم

علبة كرتون تحتوي علي فيال شفاف نوع III 10 ملي بها بودرة جافة + امبولة 4 ملي مياة للحقن ونشرة داخلية

سيفايوس 0.5 جم

علبة كرتون تحتوي علي فيال شفاف نوع III 10 ملي بها بودرة جافة + امبولة 2 ملي مياة للحقن ونشرة داخلية

من انتاج بدر فارما للصناعات الدوائية