

كيوريكلاف 457مجم/5مل بودرة جافة لعمل معلق يؤخذ طريق الفم

اقرأ هذه النشرة بالكامل بعناية قبل أن تبدأ بإعطاء طفلك هذا الدواء لأنها تحتوي على معلومات مهمة له.
-احتفظ بهذه النشرة. قد تحتاج لقراءتها مرة أخرى.
-إذا كانت لديك أسئلة أخرى ، اسأل طبيبك أو الصيدلي أو الممرضة.
-يوصف هذا الدواء عادة لطفل أو رضيع. لا تنقلها للآخرين. فهو قد يضرهم ، حتى لو كانت علامات مرضهم مماثلة لمرض طفلك.
-إذا أصيب طفلك بأي آثار جانبية ، تحدث إلى الطبيب أو الصيدلي أو الممرضة. يتضمن ذلك أي آثار جانبية محتملة غير مذكورة في هذه النشرة.

ما هو في هذه النشرة

1. ما هو كيوريكلاف وما هي دواعي استخدامه
2. ما تحتاج إلى معرفته قبل إعطاء كيوريكلاف
3. كيفية إعطاء كيوريكلاف
4. الآثار الجانبية المحتملة
5. كيفية تخزين كيوريكلاف
6. محتويات العبوة ومعلومات أخرى

1. ما هو كيوريكلاف وما هي دواعي استخدامه

كيوريكلاف هو مضاد حيوي ويعمل عن طريق قتل البكتيريا المسببة للعدوى. يحتوي على نوعين مختلفين من الأدوية تسمى أموكسيسيلين وحمض الكلافولانيك. ينتمي أموكسيسيلين إلى مجموعة من الأدوية تسمى "البنسلينات" التي يمكن أحياناً إيقافها عن العمل (جعلها غير فعالة). المكون النشط الآخر (حمض الكلافولانيك) يمنع هذا من الحدوث. يستخدم كيوريكلاف في الرضع والأطفال لعلاج الالتهابات التالية:

- التهابات الأذن الوسطى والجيوب الأنفية
- التهابات الجهاز التنفسي
- التهابات المسالك البولية
- التهابات الجلد والأنسجة الرخوة بما في ذلك التهابات الأسنان
- التهابات العظام والمفاصل.

2. ما تحتاج إلى معرفته قبل إعطاء كيوريكلاف

لا تعط طفلك كيوريكلاف:

- إذا كان لديهم حساسية من أموكسيسيلين أو حمض الكلافولانيك أو البنسلين أو أي من المكونات الأخرى لهذا الدواء.
- إذا كان لديهم في أي وقت رد فعل تحسسي شديد تجاه أي مضاد حيوي آخر. يمكن أن يشمل ذلك طفح جلدي أو تورم في الوجه أو الحلق.
- إذا كان لديهم في أي وقت مضى مشاكل في الكبد أو اليرقان (اصفرار الجلد) عند تناول المضادات الحيوية.
- لا تعطي كيوريكلاف لطفلك إذا كان أي مما سبق ينطبق على طفلك. إذا لم تكن متأكدًا ، تحدث إلى الطبيب أو الصيدلي قبل إعطاء كيوريكلاف.

المحاذير والإحتياطات

استشر الطبيب أو الصيدلي أو الممرضة قبل إعطاء طفلك كيوريكلاف إذا:

- الحمى الغدية
- يتم علاجهم من مشاكل في الكبد أو الكلى
- لا يمر الماء بانتظام.

إذا لم تكن متأكدًا مما إذا كان أي مما سبق ينطبق على طفلك ، فتحدث إلى الطبيب أو الصيدلي قبل إعطاء كيوريكلاف. في بعض الحالات ، قد يفحص طبيبك نوع البكتيريا التي تسبب عدوى طفلك. اعتمادًا على النتائج ، قد يتم إعطاء طفلك قوة مختلفة من كيوريكلاف أو دواء مختلف.

لتحذيرات والإحتياطات : السعال المصاحب للكلوستريديوم ديفيسيل: تم الإبلاغ عن السعال المصاحب للكلوستريديوم ديفيسيل مع جميع العوامل المضادة للبكتيريا تقريباً ، بما في ذلك الأموكسيسيلين ، وقد تتراوح في شدتها من السعال الخفيف إلى التهاب القولون القاتل

الظروف التي تحتاج إلى البحث عنها في

كيوريكلاف أن تجعل بعض الظروف الحالية أسوأ ، أو تسبب آثارًا جانبية خطيرة. وتشمل هذه ردود الفعل التحسسية والتشنجات (النوبات) والتهاب الأمعاء الغليظة. يجب أن تبحث عن أعراض معينة أثناء تناول طفلك كيوريكلاف لتقليل خطر حدوث أي مشاكل.

تحاليل الدم

إذا كان طفلك يخضع لاختبارات الدم (مثل اختبارات حالة خلايا الدم الحمراء أو اختبارات وظائف الكبد) ، أخبر الطبيب أو الممرضة أنهم يتناولون كيوريكلاف. وذلك لأن كيوريكلاف يمكن أن يؤثر على نتائج هذه الأنواع من الاختبارات.

أدوية أخرى كيوريكلاف

أخبر طبيبك أو الصيدلي إذا كان طفلك يأخذ أو أخذ مؤخرًا أو قد يأخذ أي أدوية أخرى. إذا كان طفلك يأخذ الويبرينول (المستخدم للنقرس) مع كيوريكلاف ، فمن المحتمل أن يكون لديه رد فعل تحسسي جلدي. إذا كان طفلك يأخذ البروبيسيند (يستخدم للنقرس) ، قد يقرر طبيبك تعديل جرعة كيوريكلاف. إذا تم تناول أدوية للمساعدة في وقف تجلط الدم (مثل الوارفارين) مع كيوريكلاف ، فقد تكون هناك حاجة لإجراء اختبارات دم إضافية. يمكن أن يؤثر كيوريكلاف على كيفية عمل الميثوتريكسات (دواء يستخدم لعلاج السرطان أو الأمراض الروماتيزمية). يمكن أن يؤثر كيوريكلاف على كيفية عمل الميكوفنولات موفتيل (دواء يستخدم لمنع رفض الأعضاء المزروعة).

الحمل والرضاعة والخصوبة

إذا كانت طفلك التي على وشك تناول هذا الدواء حامل أو مرضعة ، أو تعتقد أنها قد تكون حاملاً أو تخطط لإنجاب طفل ، فاسأل طبيبك أو الصيدلي للحصول على المشورة قبل تناول هذا الدواء.

السياقة واستعمال الماكينات

يمكن أن يكون كيوريكلاف آثار جانبية وقد تجعلك الأعراض غير لائق للقيادة.

لا تقود السيارة أو تشغل الآلات إلا إذا كنت على ما يرام.

3. كيفية إعطاء كيوريكلاف

يجب دائماً إعطاء هذا الدواء تماماً كما أخبرك طبيبك أو الصيدلي. استشر طبيبك أو الصيدلي إذا لم تكن متأكدًا.

البالغون والأطفال بوزن 40 كجم أو أكثر

• لا ينصح بهذا المعلق عادة للبالغين والأطفال الذين يبلغ وزنهم 40 كجم وأكثر. اسأل طبيبك أو الصيدلي للحصول على المشورة.

الأطفال الذين يقل وزنهم عن 40 كجم

يتم تحديد الجرعات اعتمادًا على وزن جسم الطفل بالكيلوجرام.

سوف ينصحك طبيبك بكمية كيوريكلاف التي يجب أن تعطى لطفلك .

يجب عليك استخدام الجرعة الصحيحة لطفلك.

□ الجرعة الموصى بها - 25 مجم / 3.6 مجم / كجم / يوم (0.4 مل معلق / كجم / يوم) إلى 45 مجم / 6.4 مجم / كجم / يوم (0.6 مل معلق / كجم / يوم) ، تعطى على جرعتين مقسمتين

□ جرعة أعلى - حتى 70 مجم / 10 مجم / كجم / يوم (1.0 مل معلق / كجم / يوم) ، تعطى على جرعتين مقسمتين.

مرضى الكلى والكبد

• إذا كان طفلك يعاني من مشاكل في الكلى ، فقد يتم تخفيض الجرعة. قد يختار طبيبك قوة مختلفة أو دواء مختلف.

• إذا كان طفلك يعاني من مشاكل في الكبد ، فقد يخضع لفحوصات دم متكررة لمعرفة كيفية عمل الكبد.

كيفية إعطاء كيوريكلاف

• رج العبوة دائماً جيداً قبل كل جرعة

• أعطه في بداية الوجبة أو قبلها بقليل

• تباعد الجرعات بالتساوي خلال النهار ، على الأقل 4 ساعات على حدة. لا تأخذ جرعتين في ساعة واحدة.

• لا تعطي طفلك كيوريكلاف لأكثر من أسبوعين. إذا كان طفلك لا يزال يشعر بالتوعك فيجب عليه العودة لرؤية الطبيب.

إذا أعطيت كيوريكلاف أكثر مما ينبغي:

إذا أعطيت طفلك الكثير من كيوريكلاف ، فقد تشمل العلامات اضطراب في المعدة (الشعور بالغثيان أو المرض أو الإسهال) أو التشنجات.

تحدث إلى طبيبك في أسرع وقت ممكن. خذ قنينة الدواء لترىها للطبيب.

إذا نسيت إعطاء كيوريكلاف

إذا نسيت إعطاء جرعة لطفلك ، فقم بإعطائها بمجرد أن تتذكرها. يجب ألا تعطي طفلك الجرعة التالية في وقت قريب جداً ، ولكن انتظر حوالي

4 ساعات قبل إعطاء الجرعة التالية. لا تأخذ جرعة مضاعفة لتعويض الجرعة المنسية.

إذا توقفت طفلك عن تناول كيوريكلاف

استمر في إعطاء طفلك كيوريكلاف حتى انتهاء العلاج ، حتى لو شعر بتحسن. يحتاج طفلك إلى كل جرعة للمساعدة في مكافحة العدوى. إذا

نجت بعض البكتيريا يمكن أن تتسبب في عودة العدوى.

إذا كان لديك أي أسئلة أخرى حول استخدام هذا الدواء ، اسأل طبيبك أو الصيدلي أو الممرضة.

4. الآثار الجانبية المحتملة

مثل جميع الأدوية ، يمكن أن يسبب هذا الدواء آثارًا جانبية ، على الرغم من عدم حدوثها لدى الجميع. الآثار الجانبية أدناه قد تحدث مع هذا

الدواء.

الظروف التي تحتاج إلى البحث عنها

ردود الفعل التحسسية:

- طفح جلدي

- التهاب الأوعية الدموية الذي قد يظهر على شكل بقع حمراء أو أرجوانية بارزة على الجلد ، لكنها قد تصيب أجزاء أخرى من الجسم.

- سخونة ، آلام المفاصل ، إنتفاخ الغدد في العنق ، الإبط أو الفخذ

- إنتفاخ ، أحياناً في الوجه أو الحلق (وذمة وعائية) يسبب صعوبة في التنفس

- الأنهيار.

* اتصل بالطبيب على الفور إذا ظهرت على طفلك أي من هذه الأعراض. توقف عن تناول كيوريكلاف.

- التهاب الأمعاء الغليظة

- التهاب الأمعاء الغليظة ، يسبب إسهال مائي عادة مع الدم والمخاط وآلام في المعدة و / أو حمى.

* اتصل بطبيبك في أقرب وقت ممكن للحصول على المشورة إذا كان طفلك يعاني من هذه الأعراض.

الآثار الجانبية الشائعة

قد تظهر هذه لدى حتى 1 من كل 10 أشخاص

- القلاع (المبيضات - عدوى فطرية في المهبل أو الفم أو طيات الجلد)

- الشعور بالغثيان (غثيان) ، خاصة عند تناول جرعات عالية

← إذا تأثرت باخذ كيوريكلاف قبل الطعام

- قيء

-إسهال (عند الأطفال).

أعراض جانبية غير شائعة

قد تظهر هذه لدى حتى 1 من كل 100 شخص

- طفح جلدي ، حكة

- طفح جلدي مرتفع ومثير للحكة (شرى)

- عسر الهضم

- دوار

- صداع.

أعراض جانبية غير شائعة قد تظهر في فحوصات الدم:

-زيادة في بعض المواد (الإنزيمات) التي ينتجها الكبد.

اعراض جانبية نادرة

قد تظهر هذه لدى حتى 1 من كل 1000 شخص

- طفح جلدي ، قد ينفط ، ويبدو وكأنه أهداف صغيرة (يقع داكنة مركزية محاطة بمنطقة شاحبة ، مع حلقة داكنة حول الحافة – حمامي عديدة الأشكال)

إذا لاحظت أياً من هذه الأعراض ، فاتصل بالطبيب على وجه السرعة.

أعراض جانبية نادرة قد تظهر في فحوصات الدم:

- قلة عدد الخلايا التي تدخل في عملية تخثر الدم

- قلة عدد خلايا الدم البيضاء.

غير معروف

لا يمكن تقدير التردد من البيانات المتاحة.

- تفاعلات تحسسية .

-التهاب الأمعاء الغليظة .

-التهاب الغشاء الواقي المحيط بالدماغ (التهاب السحايا العقيم)

ردود فعل جلدية خطيرة:

-طفح جلدي واسع الانتشار مع ظهور بثور وتقرش الجلد ، خاصة حول الفم والأنف والعينين والأعضاء التناسلية (متلازمة ستيفنز جونسون) ، وشكل أكثر حدة يسبب تقشرًا واسعًا للجلد (أكثر من 30% من سطح الجسم - سام تتخر البشرة)

-طفح جلدي أحمر منتشر مع ظهور بثور صغيرة تحتوي على صديد (التهاب الجلد التقشري الفقاعي)

-طفح جلدي أحمر منتشر مع نتوءات تحت الجلد وبثور (بثور طفيلي)

-أعراض تشبه الأنفلونزا مع طفح جلدي وحمى وتضخم في الغدد ونتائج غير طبيعية لفحص الدم (بما في ذلك زيادة خلايا الدم البيضاء (فرط الحمضات) وإنزيمات الكبد) (تفاعل الدواء مع فرط الحمضات والأعراض الجهازية).

*اتصل بالطبيب على الفور إذا ظهرت على طفلك أي من هذه الأعراض.

التهاب الكبد.

- يرقان ناتج عن زيادات في الدم من مادة البيليروبين (مادة منتجة في الكبد) والتي قد تجعل جلد طفلك وبياض عينيه يظهران باللون الأصفر

- التهاب الأنابيب في الكلى

- الدم يستغرق وقتاً أطول للتجلط

- فرط نشاط

- تشنجات (عند الأشخاص الذين يتناولون جرعات عالية من كيوريكلاف أو الذين يعانون من مشاكل في الكلى).

- لسان أسود يبدو مشعرًا

- يقع على الأسنان (عند الأطفال) ، يتم إزالتها عادة بالفرشاة.

الأعراض الجانبية التي قد تظهر في فحوصات الدم أو البول:

- انخفاض حاد في عدد خلايا الدم البيضاء

-انخفاض عدد خلايا الدم الحمراء (فقر الدم الانحلالي).

- بلورات في البول.

التبليغ عن الأعراض الجانبية

إذا ظهرت لديك أي آثار جانبية ، تحدث مع طبيبك أو الصيدلي. يتضمن ذلك أي آثار جانبية محتملة غير مذكورة في هذه النشرة.

4. كيفية تخزين كيوريكلاف.

احفظ هذا الدواء بعيدًا عن رؤية ومتناول أيدي الأطفال.
يجب التخزين في العلبة الأصلية لحمايته من الرطوبة. لا يجوز التخزين فوق 30 درجة مئوية.
لا تستخدم هذا الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية المدون على الكرتون. يشير تاريخ انتهاء الصلاحية إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.
التخزين بعد الحل:
يحفظ في الثلاجة (2 – 8) درجة مئوية خلال 7 أيام.

6. محتويات العبوة ومعلومات أخرى

ما يحتويه كيوريكلاف

- عبوة كرتون تحتوي على عبوة زجاجية عسلية اللون سعة 80 مل (النوع الثالث) بها مسحوق 11 جم لعمل معلق 60 مل مع نشرة داخلية.
- عبوة كرتون تحتوي على عبوة زجاجية عسلية اللون سعة 100 مل (النوع الثالث) بها مسحوق 12.83 جم لعمل معلق 70 مل مع نشرة داخلية