

ماجوريليف

كبسولات جيلاتينية صلبة

باراسيتامول 500 مجم، فينيل أفرين هيدروكلوريد 6.1 مجم، كافيين 25 مجم

اقرأ هذه النشرة بالكامل بعناية قبل البدء في تناول هذا الدواء لأنه يحتوي على معلومات مهمة لك.

احرص دائمًا على تناول هذا الدواء تمامًا كما هو موصوف في هذه النشرة أو وفقًا لطبيبك أو أخبرك الصيدلي أو الممرضة.

- احتفظ بهذه النشرة. قد تحتاج لقراءتها مرة أخرى.

- اسأل الصيدلي الخاص بك إذا كنت بحاجة إلى مزيد من المعلومات أو المشورة.

- إذا ظهرت عليك أي أعراض جانبية، تحدث مع طبيبك أو الصيدلي أو الممرضة. هذه

يشمل أي آثار جانبية محتملة غير مذكورة في هذه النشرة.

- يجب عليك التحدث إلى الطبيب إذا لم تشعر بتحسن أو إذا شعرت بسوء بعد خمسة أيام.

ما في هذه النشرة:

1. ما هي كبسولات ماجوريليف المزيلة للاحتقان والإنفلونزا التي تحتوي على مادة الكافيين وما هي مكوناتها

2. ما تحتاج إلى معرفته قبل تناول كبسولات ماجوريليف المزيلة للاحتقان والإنفلونزا مع الكافيين

3. كيفية تناول كبسولات ماجوريليف المزيلة للاحتقان والإنفلونزا مع الكافيين

4. الآثار الجانبية المحتملة

5. كيفية تخزين كبسولات مزيل الاحتقان والإنفلونزا ماجوريليف بالكافيين

6. محتويات العبوة ومعلومات أخرى

1. ما هي كبسولات ماجوريليف المزيلة للاحتقان والإنفلونزا التي تحتوي على الكافيين وما استخداماتها

يحتوي الباراسيتامول على خصائص مسكنة للألم (مسكن) وخافض للحرارة (خافض للحرارة). الكافيين منشط للتخفيف من التعب وفينيليفرين هيدروكلوريد هو أ مزيل للاحتقان لتخفيف انسداد أو سيلان الأنف. يمكن استخدام كبسولة ماجوريليف المزيلة للاحتقان والإنفلونزا مع الكافيين للتخفيف من أعراض

التهاب الجيوب الأنفية ونزلات البرد والإنفلونزا مثل الصداع وآلام الجسم وآلام الأنف واحتقان الجيوب الأنفية وانخفاض درجات الحرارة عند البالغين والأطفال (فوق 12 عامًا).

يجب عليك التحدث إلى الطبيب إذا لم تشعر بتحسن أو إذا شعرت بسوء بعد 3 أيام.

2. ما يجب أن تعرفه قبل تناول كبسولات ماجوريليف المزيلة للاحتقان والإنفلونزا

مع الكافيين

لا تتناول كبسولة ماجوريليف المزيلة للاحتقان والإنفلونزا مع الكافيين:

- مع أي من منتجات الباراسيتامول الأخرى

- إذا كنت تعاني من حساسية تجاه الباراسيتامول أو هيدروكلوريد فينيليفرين أو الكافيين أو أي من المكونات الأخرى لهذا الدواء (مدرجة في القسم 6).
- إذا كنت تتناولين أي منتج آخر يحتوي على باراسيتامول أو إذا كنت بينهما 12-15 سنة تناول أي أدوية أخرى للسعال والبرد
- إذا كنت تتناول مثبطات مونوأمين أوكسيديز أو تناولتها في اليوم التالي الـ 14 يوماً الماضية
- إذا كنت تتلقى حالياً أدوية أخرى مقلدة للودي ، مثل مزيلات الاحتقان أو بعض الأدوية لعلاج الربو أو ارتفاع ضغط الدم.
- إذا كنت تعاني من الجلوكوما أو احتباس البول
- إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم أو مرض الشريان التاجي الحاد أو أي مرض آخر

مشاكل قلبية

- إذا كنت تعاني من فرط نشاط الغدة الدرقية (فرط نشاط الغدة الدرقية).
- إذا كان لديك تاريخ من القرحة الهضمية
- إذا كان عمرك أقل من 12 سنة

المحاذير والإحتياطات

تحدث إلى طبيبك أو الصيدلي أو الممرضة قبل تناول كبسولات الكافيين ماجوريليف لإزالة الاحتقان والأنفلونزا

- إذا كنت تتناول أدوية أخرى تؤثر على الكبد
- إذا كنت تعاني من فرط نشاط الغدة الدرقية
- إذا كنت تعاني من متلازمة رينود أو مرض السكري أو مشاكل في الكلى أو الكبد
- إذا كنت تعاني من مشاكل في البروستاتا أو إذا كنت ستحصل على مخدر
- إذا كنت حاملاً أو يتم وصف أي دواء آخر
- إذا كنت تعاني من مرض الكبد الكحولي حيث أن خطر الجرعة الزائدة أكبر
- إذا كنت تعاني من نقص الوزن (أقل من 50 كجم) أو كنت تعاني من سوء التغذية
- إذا كنت تتناول كميات كبيرة من الكحول بانتظام (إدمان الكحول).
- إذا كنت تعاني من جفاف شديد
- إذا كنت مسناً
- إذا كنت تعاني من نقص الجلوتاثيون (اضطراب التمثيل الغذائي الذي قد يؤدي إلى صعوبة في تحلل الباراسيتامول)
- إذا كنت تعاني من نقص إنزيم يسمى الجلوكوز 6 فوسفات ديهيدروجينيز نقص
- إذا كنت تعاني من فقر الدم الانحلالي (انهيار غير طبيعي لخلايا الدم الحمراء).
- إذا انطبق عليك أي مما سبق ، فقد تحتاج إلى تقليل كمية الباراسيتامول
- أن تأخذ أو تتجنب تناول هذا المنتج الطبي تماماً.

الاستخدام المطول ، إلا تحت إشراف طبي يمكن أن يكون ضارًا. إذا كان لديك ارتفاع الحمى أو الأعراض تزداد سوءًا أو تستمر لمدة تزيد عن 3 أيام ، اتصل بطبيبك صيدلاني. تأخذ فقط عند الضرورة. لا تتعدى الجرعة المحددة.

الأدوية الأخرى وكبسولات ماجوريليف المزيلة للاحتقان والإنفلونزا التي تحتوي على مادة الكافيين

أخبر طبيبك أو الصيدلي إذا كنت تتناول أو تناولت مؤخرًا أو قد تتناول أيًا منها

- الأدوية المضادة للقيء مثل ميتوكلوبراميد أو دومبيريدون: قد تزيد امتصاص الباراسيتامول

- أدوية الكوليسترول مثل كوليسترامين: قد تقلل من امتصاص باراسيتامول

- مضادات التخثر مثل الوارفارين: يمكن تعزيز تأثيرها عن طريق الاستخدام طويل الأمد باراسيتامول

- الأدوية التي تؤثر على الكبد مثل مثبطات مونوامين أوكسيديز و مضادات الاكتئاب: قد تزيد من السمية الكبدية (سمية الكبد) للباراسيتامول

- العوامل المحاكية للودي مثل مزيلات الاحتقان ومضادات الاكتئاب ثلاثية الحلقات والشهية مثبطات ومنبهات نفسية شبيهة بالأمفيتامين

- قد تسبب مثبطات مونوامين أوكسيديز أحيانًا ارتفاع ضغط الدم

- موسعات الأوعية الدموية أو حاصرات بيتا (الأدوية المستخدمة لعلاج ارتفاع ضغط الدم)

- الباربيتورات (أدوية تستخدم لعلاج القلق أو لمساعدتك على النوم

- عوامل التخدير.

- فلوكلوكساسيلين. هناك خطر متزايد للإصابة بالحمى الاستقلابي ، خاصة في المرضى الذين يعانون من ضعف الكلى والكبد والإنتان وسوء التغذية وإدمان الكحول.

يرجى إخبار طبيبك أو الصيدلي إذا كنت تتناول أو تناولت مؤخرًا أي من الأدوية الأخرى ، بما في ذلك الأدوية التي يتم الحصول عليها بدون وصفة طبية.

كبسولات ماجوريليف المزيلة للاحتقان والإنفلونزا مع الطعام والشراب و الكحول

قد يزيد الكحول من الآثار الضارة للباراسيتامول

الحمل والرضاعة والخصوبة

إذا كنت حاملاً أو مرضعة ، تعتقد أنك قد تكونين حاملاً أو تخططين لذلك إنجاب طفلاً ، إسأل طبيبك أو الصيدلي للحصول على المشورة قبل تناول هذا الدواء.

لا ينصح باستخدام كبسولات ماجوريليف المزيلة للاحتقان والإنفلونزا بالكافيين مع الحمل والرضاعة الطبيعية ، مطلوب رعاية خاصة للمرضى الذين لديهم تاريخ تسمم الحمل.

يحتوي هذا الدواء على أقل من 1 ملي صوديوم كل كبسولة ، وهذا يعني "خال من الصوديوم".

3. كيفية تناول كبسولات ماجوريليف المزيلة للاحتقان والإنفلونزا مع الكافيين

احرص دائماً على تناول هذا الدواء تماماً كما هو موصوف في هذه النشرة أو وفقاً لطبيبك أو أخبرك الصيدلي أو الممرضة. استشر طبيبك أو الصيدلي أو الممرضة إذا أنت لست متأكداً.

يحتوي هذا الدواء على باراسيتامول. استخدم دائماً أقل جرعة فعالة لـ أقصر وقت ضروري لتخفيف الأعراض.

الجرعة الموصى بها هي:

البالغين والأطفال فوق 16 سنة: كبسولتان كل 4 ساعات. لا تتجاوز 8 كبسولات في 24 ساعة.

الأطفال 12-15 سنة: كبسولة واحدة كل 4-6 ساعات. لا تتجاوز 4 كبسولات في 24 ساعات. لا تأخذ أكثر من 3 أيام.

لا تعطيه للأطفال دون سن 12 سنة.

عن طريق الفم. يجب ابتلاع الكبسولات كاملة بالماء. لا تمضغ

إذا تناولت أكثر من كبسولات ماجوريليف المزيللة للاحتقان والإنفلونزا مع الكافيين يجب طلب المشورة الطبية على الفور في حالة الجرعة الزائدة بسبب خطر تلف الكبد الذي لا رجعة فيه. قد تظهر أعراض فرط الجرعة على شكل غثيان ،

القيء وفقدان الشهية وآلام البطن والجس أو ارتفاع ضغط الدم.

إذا نسيت تناول كبسولات ماجوريليف المزيللة للاحتقان والإنفلونزا مع الكافيين

خذ الجرعة التالية بمجرد أن تتذكرها ، إذا لزم الأمر. لا تأخذ جرعة مضاعفة ل يعوض عن جرعة منسية. يجب تناول هذا المنتج عند الضرورة فقط. إذا لديك أي أسئلة أخرى حول استخدام هذا المنتج ، اسأل الصيدلي الخاص بك.

4. الآثار الجانبية المحتملة

كما هو الحال مع جميع الأدوية ، يمكن أن تتسبب كبسولات ماجوريليف المزيللة للاحتقان والإنفلونزا التي تحتوي على مادة الكافيين في حدوث أعراض جانبية الآثار ، على الرغم من أن الجميع لا يحصل عليها.

الآثار الجانبية نادرة ولكنها قد تشمل:

- تفاعلات فرط الحساسية مثل الطفح الجلدي.

- قلة الصفائح (انخفاض في عدد الصفائح الدموية مما قد يعني أنك تنزف

أو كدمة أكثر سهولة) أو ندرة المحبيبات (انخفاض في خلايا الدم البيضاء التي

جعل العدوى أكثر احتمالاً).

- من الآثار الجانبية المحتملة لفينيليفرين ارتفاع ضغط الدم مع الصداع ،

قد يحدث قيء ونادراً خفقان القلب.

- قد يعمل هذا المستحضر كمنبه للدماغ يؤدي إلى الأرق (مضطرب

النوم) ، والعصبية ، ودرجات الحرارة المرتفعة ، وهزات التشنجات.

التبليغ عن الأعراض الجانبية

إذا عانيت من أي آثار جانبية ، تحدث إلى طبيبك أو الصيدلي أو الممرضة. هذا يشمل

أي آثار جانبية محتملة غير مذكورة في هذه النشرة.

5. كيفية تخزين كبسولات مزيل الاحتقان والإنفلونزا ماجوريليف بالكافيين

احفظ هذا الدواء بعيداً عن رؤية ومتناول أيدي الأطفال

لا تستخدم هذا الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية المدون على. يشير تاريخ انتهاء الصلاحية إلى اليوم الأخير من نفس الشهر. لا تخزن

فوق 30 درجة مئوية.

لا تتخلص من الأدوية في مياه الصرف الصحي أو النفايات المنزلية. اسأل الصيدلي كيفية التخلص من الأدوية التي لم تعد بحاجة إليها. هذه التدابير سوف تساعد في حماية البيئة.

6. محتويات العبوة ومعلومات أخرى

ماذا تحتوي كبسولات ماجوريليف المزيلة للاحتقان والإنفلونزا مع الكافيين

تحتوي كل كبسولة على 500 ملغ باراسيتامول ، 6.1 ملغ فينيليفرين هيدروكلوريد ، و25 مجم كافيين كمكونات نشطة. المكونات الأخرى هي (محتويات الكبسولات).

كروسكارميلوز الصوديوم ، لوريلسلفات الصوديوم ، ستيرات المغنيسيوم

العبوة

علبة كرتون تحتوي علي شريطين كل واحد به 10 كبسولات صلبة ونشرة داخلية.

انتاج مصنع بدر فارما لصناعات الدوائية