

اسم الدواء

فلاترولام 220 مجم /5ملي شراب معلق
نيفوروكسازيد

المكونات

اقرأ هذه النشرة بالكامل بعناية قبل تناول هذا الدواء لأنها تحتوي على معلومات مهمة بالنسبة لك.
احتفظ بهذه النشرة. قد تحتاج إلى قراءتها مرة أخرى .
إذا كانت لديك أسئلة أخرى ، اسأل طبيبك أو الصيدلي -
وصف هذا الدواء. لا تعط هذا لأي شخص آخر. فهو قد يضرهم ، حتى لو كانت أعراض مرضهم هي نفس أعراضك -
إذا ظهرت لديك أي أعراض جانبية ، تحدث مع طبيبك أو الصيدلي. هذا ينطبق أيضًا على أي آثار جانبية غير مذكورة في هذه -
النشرة. انظر القسم 4

ماذا يحتوي هذا الكتيب؟

- 1- ما هو فلاترولام 220 مجم /5ملي شراب معلق وفي أي حالات يتم استخدامه؟
- 2- ما الذي يجب أن أعرفه قبل تناول فلاترولام 220 مجم /5ملي شراب معلق؟
- 3- كيف تأخذ فلاترولام 220 مجم /5ملي شراب معلق؟
- 4- ما هي الآثار الجانبية المحتملة؟
- 5- كيف يتم تخزين فلاترولام 220 مجم /5ملي شراب معلق؟
- 6- محتويات العبوة ومعلومات أخرى.

1- ما هو فلاترولام 220 مجم /5ملي شراب معلق وما هي دواعي استعماله؟
مجموعة العلاج الدوائي - مضادات معوية -هذا الدواء مضاد للجراثيم المعوي.
يشار إلى أنه بالإضافة إلى معالجة الجفاف ، في علاج الإسهال الحاد الناجم عن العدوى عند الأطفال فوق سن سنتين.
العلاج لا يستعني عن التدابير الغذائية ومعالجة الجفاف إذا لزم الأمر.
يجب عليك الاتصال بطبيبك إذا لم تشعر بأي تحسن أو إذا كنت تشعر بصحة أقل بعد تناول فلاترولام 220 مجم /5ملي شراب معلق.

2- ما الذي تحتاج إلى معرفته قبل تناول فلاترولام 220 مجم /5ملي شراب معلق؟

لا تأخذ أبدًا فلاترولام 220 مجم /5ملي شراب معلق
إذا كنت تعاني من حساسية تجاه مشتقات النيتروفوران أو أي من المكونات الأخرى للمنتج.
عند الخدج ، حديثي الولادة أقل من شهر والرضع أقل من عامين.

المحاذير والإحتياطات

يجب عليك استشارة طبيبك على الفور في الحالات التالية:
-في حالة الإسهال أكثر من 6 براز سائل في اليوم أو استمر لأكثر من 24 ساعة أو مصحوبًا بفقدان الوزن. سيحكم طبيبك بعد ذلك على الحاجة إلى وصف معالجة الجفاف التي يمكن إجراؤها عن طريق الفم.
-إذا أصيبوا بالحمى والقيء.
-في حالة وجود دم أو مخاط في البراز.
من الضروري احترام طرق الاستخدام وكذلك طريقة إعادة تكوين محلول معالجة الجفاف الفموي الذي قد يصفه طبيبك واتباع نصيحته المتعلقة بالنظام الغذائي.
سيتم مناقشة التخلص من الحليب ومشتقاته مع الطبيب.
يحتوي هذا الدواء على السكروز. لا ينصح باستخدامه في المرضى الذين يعانون من عدم تحمل السكروز (مرض وراثي نادر).
يحتوي هذا الدواء على ميثيل باراهيدروكسي بنزوات وقد يسبب تفاعلات تحسسية.
يحتوي هذا المنتج الطبي على 39 مجم صوديوم لكل 100 جم ، أي 2.14 مجم لكل 5 مل ملعقة قياسي. يؤخذ في الاعتبار عند المرضى الذين يتحكمون في تناولهم للصوديوم.

الأطفال والمراهقون
لا ينطبق.

أدوية أخرى فلاترولام 220 مجم /5ملي شراب معلق
أخبر طبيبك أو الصيدلي إذا كنت تتناول أو تناولت مؤخرًا أو قد تتناول أي أدوية أخرى.

فلاترولام 220 مجم /5ملي شراب معلق مع الطعام والشراب والكحول
لا ينطبق.

الحمل والرضاعة

إذا كنت حاملاً أو مرضعة ، تعتقد أنك حامل أو تخططين لإنجاب طفل ، اسأل طبيبك أو الصيدلي للحصول على المشورة قبل تناول هذا الدواء.

حمل

من الأفضل عدم استخدام هذا الدواء أثناء الحمل.
اسأل طبيبك أو الصيدلي للحصول على المشورة قبل تناول أي دواء.

الرضاعة بالحليب

لا تزال الرضاعة الطبيعية ممكنة إذا تناولت هذا الدواء لفترة قصيرة.
اسأل طبيبك أو الصيدلي للحصول على المشورة قبل تناول أي دواء.

القيادة واستعمال الماكينات

لا ينطبق.

فلاترولام 220 مجم /5ملي شراب معلق يحتوي على سواغات ذات تأثير معروف: صوديوم ، سكروز ، ميثيل باراهيدروكسي بنزوات.

3- كيف تستعمل فلاترولام 220 مجم /5ملي شراب معلق؟

احرص دائماً على تناول هذا الدواء تماماً كما أخبرك طبيبك أو الصيدلي. استشر طبيبك أو الصيدلي إذا كان لديك شك.

الاستخدام للأطفال فوق سنتين: 3 ملاعق قياس يومياً في 3 جرعات.

طريق شفوي.

يُرج جيداً قبل الاستخدام.

يجب ألا تزيد مدة العلاج عن 7 أيام.

إذا تناولت فلاترولام 220 مجم /5ملي شراب معلق ، معلق فموي أكثر مما يجب ، استشر طبيبك أو الصيدلي على الفور.
إذا نسيت تناول فلاترولام 220 مجم /5ملي شراب معلق، فلا تتناول جرعة مضاعفة لتعويض الجرعة التي نسيت تناولها.

إذا توقفت عن تناول فلاترولام 220 مجم /5ملي شراب معلق
لا ينطبق.

4. ما هي الآثار الجانبية المحتملة؟

مثل جميع الأدوية ، يمكن أن يسبب هذا الدواء آثارًا جانبية ، على الرغم من عدم حدوثها لدى الجميع.

احتمالية حدوث تفاعلات تحسسية مثل الطفح الجلدي ، والأرتكاريا ، والوذمة الوعائية (تورم مفاجئ في جزء من الجسم يحدث غالبًا في الوجه أو اللسان أو الرقبة) أو صدمة الحساسية (يمكن تعميم صدمة الحساسية).

التبليغ عن الأعراض الجانبية

إذا ظهرت لديك أي آثار جانبية ، تحدث إلى طبيبك أو الصيدلي. هذا ينطبق أيضًا على أي آثار جانبية غير مذكورة في هذه النشرة. من خلال الإبلاغ عن الآثار الجانبية ، يمكنك المساعدة في توفير مزيد من المعلومات حول سلامة هذا الدواء.

5. كيف يخزن فلاترولام 220 مجم / 5 ملي شراب معلق ؟

احفظ هذا الدواء بعيدًا عن رؤية ومتناول أيدي الأطفال.

لا تستخدم هذا الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية المدون على الكرتون.

لا يجوز رمي أي دواء في مياه الصرف الصحي أو النفايات المنزلية. اسأل الصيدلي عن كيفية التخلص من الأدوية التي لم تعد تستخدمها. ستساعد هذه الإجراءات في حماية البيئة.

6. محتويات العبوة ومعلومات أخرى ارجع إلى أعلى الصفحة

ما يحتوي فلاترولام 220 مجم / 5 ملي شراب معلق ؟

المادة الفعالة هي:

نيفوروكسازيد

تحتوي ملعقة قياس واحدة بحجم 5 مل على 220 مجم من النيفوروكسازيد.

· **المكونات الأخرى هي:** إيديتات ثنائي الصوديوم ، ميثيل بارابين ، بروبييل برابين ، بولي سوربات 80 ، سكرين الصوديوم ، نكهة الموز ، السليلوز القابل للتشتت ، الجلسرين ، الماء النقي.

نكهة الموز تحتوي على السكروز.

ما هو فلاترولام 220 مجم / 5 ملي شراب معلق ومحتويات العبوة الخارجية
علبة كرتون تحتوي علي رزاجة عسلية اللون بها 100 مل شراب معلق ونشرة داخلية.
علبة كرتون تحتوي علي رزاجة عسلية اللون بها 60 مل شراب معلق ونشرة داخلية