

بادوزيثرو

200مجم/5مل

بودرة جافة لعمل معلق يؤخذ عن طريق الفم

معلومات للمستخدم

اقرأ هذه النشرة بعناية قبل البدء في تناول هذا الدواء لأنه يحتوي على معلومات مهمة لك.

- احتفظ بهذه النشرة. قد تحتاج لقراءتها مرة أخرى.
- إذا كان لديك أي أسئلة أخرى ، اسأل الطبيب أو الصيدلي.
- تم وصف هذا الدواء لك فقط فلا تنصح غيرك باستخدامه دون استشارة الطبيب فقد يضرهم ، حتى لو كانت علامات مرضهم هي نفس علامات مرضك .
- إذا كنت تعاني من أي آثار جانبية فتحدث إلى طبيبك أو الصيدلي. وهذا يشمل اي اثار جانبية وان لم تكن مذكورة ضمن الاعراض المدرجة بالنشرة, انظر القسم 4.

محتويات النشرة

1. ما هو بادوزيثرو وفما يستخدم .
2. ما الذي تحتاج إلى معرفته قبل أن تأخذ بادوزيثرو.
3. كيفية تناول بادوزيثرو.
4. الآثار الجانبية المحتملة
5. كيفية تخزين بادوزيثرو
6. محتويات العبوة وغيرها من المعلومات.

1. ما هو بادوزيثرو وفما يستخدم .

- بادوزيثرو هو واحد من مجموعة المضادات الحيوية المسماه الماكروليدات. يستخدم لعلاج الالتهابات التي تسببها الكائنات الحية الدقيقة مثل البكتيريا, وتشمل هذه الأمراض:
- التهابات الصدر مثل التهاب الشعب الهوائية الحاد والالتهاب الرئوي
 - التهابات الجيوب الأنفية ، الحلق ، اللوزتين أو الأذن.
 - العدوى الخفيفة الى المتوسطة للأنسجة الخلوية, مثل عدوى بصيلات الشعر(التهاب الجريبات) ، العدوى البكتيرية للجلد وطبقاته العميقة (التهاب النسيج الخلوي) ، عدوى الجلد المصاحبة لتورم أحمر لامع (الحمرة)
 - الالتهابات التي تسببها بكتيريا تسمى الكلاميديا الحثرية والتي يمكن ان تسبب التهاب الانبوبة التي تحمل البول من المثانة (مجرى البول) أو من حيث يرتبط الرحم بالمهبل (عق الرحم).

2. ما تحتاج إلى معرفته قبل أن تأخذ بادوزيثرو.

لا تأخذ أزيثروميسين:

- إذا كنت تعاني من حساسية من أزيثروميسين أو أي مضاد حيوي آخر لماكرولايد أو كيتوليد ، مثل ايثروميسين أو تيلثروميسين او أي من المكونات الأخرى لهذا الدواء (المدرجة في القسم 6).
- اذا كان لديك تاريخ من الإصابة بالصفراء او القصور الكبدى المرتبط بالاستخدام المسبق لـ بادوزيثرو

المحاذير والإحتياطات

تحدث إلى طبيبك قبل تناول أزيثروميسين في الحالات الاتية:

- إذا كان لديك رد فعل تحسسى خطير تسبب في حدوث تورم في الوجه والحلق ربما مع وجود مشاكل في التنفس.
- إذا كنت تعاني من مشاكل شديدة في الكلى فقد يقوم طبيبك بتغيير الجرعة.
- التسمم الكبدي : قد سجلت حالات (وظائف الكبد غير الطبيعية والالتهاب الكبدي والصفراء وتليف الكبد والفشل الكبدي) وقد أدى بعضها الي الوفاة . توقف عند تناول بادوزيثرو عند ظهور اعراض الالتهاب الكبدي .
- إذا كنت تعاني من مشاكل في الكبد, فقد يحتاج طبيبك الى مراقبة وظائف الكبد أو وقف العلاج.
- إذا كنت تدرك انه قد تم تشخيصك مسبقا بالاصابة بمتلازمة فترة QT المطولة (مرض القلب), ففي هذه الحالة لا ينصح باستخدام بادوزيثرو.
- ان كنت تتدرك أن لديك بطأ أو عدم انتظام في ضربات القلب أو خلل في وظيفة القلب, في هذه الحالة لا ينصح باستخدام بادوزيثرو.
- إذا كنت تدرك أن لديك انخفاض في مستويات البوتاسيوم أو المغنيسيوم في دم, في هذه الحالة لا ينصح باستخدام بادوزيثرو.
- إذا كنت تتناول الأدوية المعروفة باسم مضادات عدم انتظام ضربات القلب (تستخدم لعلاج اضطراب ضربات القلب) ، سيسابريد (تستخدم لعلاج مشاكل المعدة) ، تيرفيتادين (مضادات الهيستامين المستخدمة لعلاج الحساسية) ، الأدوية المضادة للذهان (مثل الليموزيد) ، مضادات الاكتئاب (مثل سيتالوبرام) أو بعض المضادات الحيوية (مثل موكسيفلوكساسين ، ليفولوكساسين):

- في هذه الحالات لا ينصح باستخدام بادوزيثرو.
- تناول الأدوية المعروفة باسم الإرغوت قلويدات (مثل الإرغوتامين) ، وهي تستخدم لعلاج الصداع النصفي, في هذه الحالة لا ينصح باستخدام بادوزيثرو (انظر "الأدوية الأخرى وأزيتروميسين 'أدناه).
- إذا قد تم تشخيصك مسبقا بأحد الامراض العصبية تلك التي تصيب الدماغ أو الجهاز العصبي.
- إذا كنت تعاني من وجود مشاكل عقلية أو عاطفية أو سلوكية.
- إذا كان لديك حالة تعرف باسم الوهن العضلي، مع تعب واستنفاد للعضلات , بادوزيثرو قد يؤدي الى تفاقم أو التسبب في اعراض الوهن العضلي.
- إذا كنت تعاني من الإسهال الحاد والمستمر أثناء أو بعد العلاج, خاصة إذا لاحظت وجود الدم أو المخاط ، فعليك إخبار الطبيب فوراً.
- إذا استمرت الأعراض الخاصة بك بعد نهاية العلاج ب بادوزيثرو ، أو إذا لاحظت ظهور أى أعراض جديدة ومستمرة, فعليك التواصل مع طبيبك.
- لا ينصح باستخدام بادوزيثرو للمرضى بعمر أقل من 6 أشهر.

أدوية أخرى وبادوزيثرو:

- أخبر طبيبك أو الصيدلي إذا كنت تتناول او قمت مؤخرًا بتناول أي من الأدوية التالية:
- مضادات الحموضة ، على سبيل المثال هيدروكسيد الألومنيوم, يتم تناول بادوزيثرو على الأقل قبل ساعة أو بعد ساعتين من تناول مضادات الحموضة.
- مشتقات الإرغوت ، على سبيل المثال الإرغوتامين (تستخدم لعلاج الصداع النصفي), لا ينبغي تناول بادوزيثرو بشكل متزامن مع تناول الإرغوتامين فذلك قد يؤدي الى حدوث تطور سلبي(أحتمالة حدوث تأثير جتنبى خطير مع الشعور بتخدير أو وخز في الاطراف، وتشنجات في العضلات ، والصداع ، والتشنجات ، ألم في البطن أو الصدر)
- مضادات التخثر الفموية من نوع الكومارين ، على سبيل المثال الوارفارين (يستخدم لوقف تخثر الدم), فإن خطر النزيف قد يزداد.
- الديجوكسين (يستخدم لعلاج قصور القلب) أو كولشيسين (يستخدم في النقرس وحمى البحر المتوسط العائلية), قد ترتفع مستويات الديجوكسين / الكولشيسين في دمك.
- زيدوفودين ، نلفينافير (يستخدم في العلاج من فيروس نقص المناعة البشرية), فقد ترتفع مستويات زيدوفودين أو بادوزيثرو.
- ريفابوتين (يستخدم في علاج فيروس نقص المناعة البشرية والالتهابات البكتيرية بما في ذلك السل), قد يحدث استخدامه الى انخفاض في عدد كريات الدم البيضاء.
- السيكلوسبورين (أحد مثبتات المناعة المستخدمة بعد زرع الأعضاء), فقد ترتفع مستويات السيكلوسبورين. سوف يقوم طبيبك بمراقبة مستويات السيكلوسبورين في الدم.
- سيسابريد (يستخدم لعلاج مشاكل المعدة): قد تحدث مشاكل في القلب.

- أستيميزول ، تيرفينينا (مضادات الهستامين المستخدمة لعلاج الحساسية), فقد يذاد تأثيرها.
- الفنتانيل (مسكن للألم): قد يزداد تأثير الفنتانيل .
- الفلوكونازول (للعدوى الفطرية): قد تؤدي الى انخفاض مستويات.
- أتورفاستاتين (يستخدم لخفض الدهون في الدم): قد يصاحب استخدام بادوزيثرو تزامنا مع استخدام أتورفاستاتين الى زيادة خطر تمزق أنسجة العضلات (انحلال الربيدات) التي قد تؤدي إلى آلام في العضلات مع البول الداكن.
- لم يلاحظ أي تفاعل بين بادوزيثرو وسيتريزين (مضادات الهستامين) ؛
- لم يلاحظ أي تفاعل بين بادوزيثرو وسيتريزين (أحد مضادات الهستامين) ؛ ثنائي الدينوسين ، اففيريمز اندينافير (لحالات اللصابة بالتهاب الكبد الوبائي) ؛ كاربامازيبين (لعلاج الصرع) ؛ السيميتيدين (مضاد للحموضة) ؛ ميتيل بريدينزولون في حالات قمع الجهاز المناعي) ؛ ميدازولام، تريازولام (المهدئات) ؛ فياغرا (للعجز) ، الثيوفيلين (للربو) و تريميثوبريم / سلفاميثوكسازول (مزيج مضاد حيوي).

الحمل والرضاعة الطبيعية

إذا كنتي حاملاً أو تقومي بالرضاعة قد تكوني حامل أو تخططين لهذا فعليك إخبار الطبيب قبل البدء في استخدام هذا الدواء. لا توجد معلومات كافية بخصوص سلامة استخدام بادوزيثرو أثناء الحمل والرضاعة. لذا لا ينصح باستخدام بادوزيثرو إذا كنت حاملاً أو تخططين لذلك أو إذا كنت تقومين بالرضاعة الطبيعية. ومع ذلك قد ينصحك الطبيب باستخدامه الطبيب ذلك تحت ظروف خطيرة.

قد تم التقرير عن إفراز بادوزيثرو في حليب الثدي لدى النساء ، ولكن لم تتوفر دراسات سريرية كافية وحاسمة عن الحركة الدوائية المرتبطة بإفراز دواء بادوزيثرو في حليب الثدي لدى النساء. عليك عدم استخدام هذا الدواء في حالات الرضاعة الطبيعية إن لم يوصى الطبيب المعالج به بشكل محدد. إن هذا الدواء يفرز في الحليب, لذا يجب عليك التوقف لمدة يومين قبل البدء في الرضاعة الطبيعية وذلك بعد انتهاء تناولك لهذا الدواء.

القيادة واستخدام الآلات

هذا الدواء قد يسبب آثار جانبية مثل الدوخة أو التشنجات, وهذا قد يجعلك أقل قدرة على القيام بأشياء معينة ، مثل القيادة أو استخدام الآلات.

- بادوزيثرو يحتوي على 3.87 جم من السكروز لكل 5 مل معلق .

إذا قام طبيبك بإخبارك مسبقاً بأن لديك حساسية لبعض السكريات فعليك إخبار الطبيب المعالج بذلك قبل تناولك لهذا الدواء. حيث أنه يجب الإخذ في الاعتبار كمية السكروز الموجودة بالدواء عندما يتعلق الأمر بمرضى السكرى.

3. كيفية تناول بادوزيثرو:

يجب عليك داءماً الالتزام بتناول هذا الدواء كما أو لك الطبيب المعالج, ويمكنك استشارة الطبيب أول الصيدلى في حالة ما لم تكن متأكد.

تحضير المعلق

يتم تحضير المعلق بواسطة الصيدلى , وفي حالة ما لم يتم ذلك فعليك مراجعة الصيدلى ليقوم بتحضيره.

الجرعة

يتم استخدام معلق بادوزيثرو مرة واحدة يومياً مع أو بدون الطعام. يجب رج الزجاجة جيداً قبل الاستعمال.

الجرعة الموصى بها هي:

- الاستخدام لدى الأطفال والمراهقين مع وزن فوق 45 كجم و البالغين والمسنين

الجرعة الإجمالية ل بادوزيثرو هي 37.5 مل (1500 ملجم) على مدى 3 أيام: 12.5 مل (500 ملجم) للمرة الواحدة يومياً . و بالتبادل, يمكن أن تكون الجرعة موزعة على 5 أيام: 12.5 مل (500 ملجم) جرعة واحدة في اليوم الأول ثم 6.25 مل (250 ملجم) مرة واحدة يومياً.

-جرعة لالتهاب مجرى البول أو عنق الرحم الناجم عن كلاميديا الحثرية هو

25 مل (1000 ملجم) في جرعة واحدة.

لالتهاب الجيوب الأنفية ، يستهدف الدواء علاج البالغين والمراهقين فوق 16 سنة.

الاستخدام لدى الأطفال والمراهقين بوزن أقل من 45 كجم

يجب أن يتم تعيين الجرعة المحددة من معلق بادوزيثرو بعناية في حالات الاستخدام للامن وزن 10 الى 15 كجم. أما بالنسبة للأطفال بوزن اكثر من 15 كجم, يتم تعيين الجرعة المحددة من معلق بادوزيثرو بأستخدام ملعقة الجرعات وفقاً للخطة التالية:

| الوزن | لمدة 3 ايام | لمدة 5 ايام |
|-----------|--|---|
| 10-15 كجم | 0,25 مل/كجم(10مجم/كجم) مرة يوميا من يوم الاول الي اليوم الثالث | 25مل/كجم(10مجم/كجم) مرة يوميا في اليوم الاول يليها 125,0مل(5مجم/كجم) مرة يوميا من اليوم الثاني الى اليوم الخامس |
| 16-25 كجم | 5 مل/(200 جم) مرة يوميا من يوم الاول الي اليوم الثالث | 5مل(200جم) مرة يوميا في اليوم الاول يليها 2.5مل(100مجم) يوميا من اليوم الثاني الي اليوم الخامس |
| 26-35 كجم | 7,5 مل(300مجم) مرة يوميا من يوم الاول الي اليوم الثالث | 7,5 مل(300مجم) مرة يوميا من يوم الاول ياليها 3.75 مل(150مجم) مرة يوميا من اليوم الثاني الي اليوم الخامس |
| 35-45 كجم | 10مل/كجم(400جم) مرة يوميا من يوم الاول الي اليوم الثالث | 10مل/كجم(400جم) مرة يوميا في اليوم الاول يليها 5مل(200مجم) يوميا من اليوم الثاني الي اليوم الخامس |
| <45كجم | جرعة البالغين | |

لعلاج التهاب اللوزتين / التهاب البلعوم

الأطفال الذين تتراوح أعمارهم من عامين أو أكثر:

يتم تناول جرعة يوميا من معلق بادوزيثرو بكمية 10 ملغ / كجم أو 20 ملغ / كجم لمدة ثلاثة ايام ، حيث ان أنه ينبغي عدم الوصول الى الجرعة القصوى للأستخدام اليومي وهي 500 ملجم.

إلتهاب الجيوب الانفية:

لعلاج التهاب الجيوب الأنفية ، هناك معلومات محدودة عن أستخدام هذا الدواء للعلاج لدى الأطفال تحت سن 16 عاما.

المرضى الذين يعانون من مشاكل في الكلى أو الكبد : عليك إخبار طبيبك المعالج في حالة ما اذا كان لديك مشاكل في الكلى أو الكبد فقد يقوم طبيبك بتعديل الجرعة المحددة.

أ. تعليمات الحقن:

ملء السرنجة بالدواء

1- رج الزجاجة قبل الاستخدام وإزالة الغطاء المقاوم.

2- ضع الزجاجة علي سطح مستوي ، قم بتثبيتها بيد واحدة, وباليد الأخرى قم بإدخال طرف السرنجة في المعلق.

3- اسحب ببطء المكبس واملأ السرنجة.

4- في حالة وجود فقاعات كبيرة في الحقنة قم بدفع المكبس ببطئ مرة أخرى إلى الحقن.ه هذا سيجبر الدواء الى العودة مرة أخرى إلى الزجاجة. وقم بتكرير الخطوة 3 مرة أخرى.

5- إزالة الحقنة من الزجاجة.

إعطاء الدواء باستخدام الحقنة

1- تأكد من ان الطفل في وضع رأسي.

2- ضع رأس الحقنة بعناية في فم الطفل,قم بتوجيه الحقنة نحو الخد من الداخل.

3- دفع مكبس الحقنة ببطئ, لا تقم ببخها بسرعة . فقد يتدفق الدواء في فم الطفل.

4- السماح للطفل لابتلاع الدواء.

- 5- ضعي غطاء الواقي على الزجاجة وقم بغسل السرنجة كما هو موضح أدناه.
6- للجرعات اليومية أقل من 5 مل لمدة ثلاثة أيام ، سيتبقى بعض المعلق بالزجاجة والذي يجب التخلص منه.

ب . تعليمات الملعقة

لا ينبغي استخدام الملعقة للأطفال أقل من 3 سنوات (أقل من 15 كجم).

إعطاء الدواء باستخدام المعيار البلاستيكي :

- 1- يتم توفير معيار مع الدواء, قم بالتحقق الى اي مستوى تكون الجرعة المطلوبة إلى أي مستوى يعطي الجرعة مطلوب. إذا كنت غير متأكد ، تحقق من ذلك من الطبيب أو الصيدلي. المعيار متعددة الجرعات توفى بالجرعات الآتية:
2.5 مل (100 ملجم) .
3.75 مل (150 ملجم).
5 مل (200 ملجم).
- 2- قم برج العبوة جيدًا ثم قم بإزالة الغطاء الحماية .
- 3- قم بصب الجرعة المحددة من الدواء بلطف في المعيار.
- 4- اسمح للمريض بابتلاع الدواء ببطء.
- 5- قم بغسل المعيار تحت الماء الجارى و الدافئ ثم قم بتجفيفها وحفظها مع الدواء في مكان آمن.

تحذير:

قم بإعطاء الدواء ببطء للطفل أو الطفلة وذلك لتفادي حدوث حالة أختناق حيث انه (أنها) تقوم بتناول الدواء في وضع عمودى. إذا تناولت كميات كبيرة من بادوزيثرو (أو أي شخص آخر) فعليك بالاتصال بطبيبك أو الصيدلي على الفور, فإن تناول جرعة زائدة من المرجح ان تتسبب في فقدان السمع القابل للعكس والغثيان الشديد(الشعور بالإعياء) والتقيؤ والإسهال. يرجى أخذ هذه النشرة مع المتبقى من الملعق الموجود بالزجاجة عند التوجه الى المستشفى او الطبيب وذلك ليتثنى لهم معرفة الدواء الذى تم أستهلاكه بهذه الكميات. يرجى أخذ هذه النشرة ، أي المتبقية الدواء العبوة معك إلى المستشفى أو الطبيب حتى يعرفوا أي تم استهلاك الدواء.

إذا نسيت تناول دواء بادوزيثرو:

إذا نسيت تناول جرعة لك فيمكنك أن تتناولها فور تذكرك ما لم يكن حان موعد الجرعة التالية, و عليك الا تأخذ جرعة مضاعفة لتعويض جرعة منسية.

في حالة توقفك عن تناول بادوزيثرو:

عليك عدم التوقف عن تناول بادوزيثرو دون التحدث الى الطبيب المعالج أولا حتى وان كنت تشعر بتحسن , فإنه من المهم جدا أن تستمر في تناول عقار بادوزيثرو لطالما اخبرك طبيبك بذلك وإلا فإن العدوى قد يعود. إذا كان لديك أي أسئلة أخرى حول استخدام هذا الدواء ، اسأل طبيبك أو الصيدلي.

4. الآثار الجانبية المحتملة

مثل جميع الأدوية ، يمكن أن يتسبب هذا الدواء في حدوث آثار جانبية ، على الرغم بأنه ليس كل من يستخدم هذا الدواء قد يتعرض لها. في حالة حدوث الاتى، توقف عن تناول دواء بادوزيثرو وأخبر طبيبك فوراً أو قم بالتوجه إلى قسم الإصابات في أقرب مستشفى.

غير شائع (قد يؤثر على شخص واحد من بين كل 100 شخص):

•وذمة وعائية عصبية: رد فعل تحسسي مع حدوث تورم فى الشفاه والوجه أو الرقبة مما يؤدي إلى صعوبة شديدة في التنفس؛ طفح جلدي أو قشعريرة.

نادر: قد يؤثر على شخص واحد من كل 1000 شخص

•هيجان الجلد و الذى يصحبه ظهور مناطق ذات لون أحمر بالجلد مع بثرات صغيرة (بثور صغيرة مليئة سائل أبيض / أصفر)

نادر جداً: قد يؤثر على ما يصل إلى شخص واحد من كل 10000 شخص

حدوث حساسية مفرطة مع طفح في الجلد و حمى و تورم الغدد الليمفاوية تورم و كذلك ضعف الأعضاء(DRESS)

غير معروف (لا يمكن تقدير المتوسط من البيانات المتاحة):

•الحساسية: الحساسية المفرطة و رد الفعل الذي قد يتسبب فى صعوبة التنفس أو الدوخة وقد يؤدي إلى حدوث صدمة

•اضطرابات الكبد الحادة أو فشل الكبد

(نادرًا ما تهدد الحياة): علامات قد تشمل الاعياء المرتبط بإصفرار الجلد أو بياض العينين (اليرقان)، البول ذو لون قاتم ، احتمالية حدوث نزيف.

•بثور / نزيف في الشفاه والعينين والأنف ، الفم والأعضاء التناسلية ، والتي قد تسببها متلازمة ستيفنز جونسون ، حمامى متعددة الأشكال أو التنخر السمي للبشرة ، وهي أمراض خطيرة.

• حدوث تغيير في معدل ضربات القلب ، وتغيرات في نشاط القلب الكهربائي (كيو تي المطولة ، عدم انتظام دقات القلب البطيئي و ضفيرة النتوءات)

• الإسهال المطول والممتزج بالدم والمخاط (الإسهال المرتبط بالمطثية العسيرة أو التهاب القولون بالمطثية العسيرة) هذه اعراض جانبية خطيرة. قد تحتاج عناية طبية عاجلة أو دخول المستشفى.

آثار جانبية أخرى

شائع جداً (قد يؤثر على أكثر من 1 في 10 أشخاص):

• إسهال

شائع (قد يؤثر على شخص واحد من كل 10 أشخاص):

• التغييرات في أعداد كرات الدم البيضاء وكذلك نسبة البكتريونات بالدم.

• صداع الراس

• القيء وآلام البطن والشعور بالإعياء.

غير شائعة (قد يؤثر على شخص واحد من بين كل 100 شخص):

• عدوى الخميرة مثل من الفم (القلاع) ، العدوى المهبلية والالتهاب الرئوي والعدوى البكتيرية

• التهاب الحلق ، التهاب بطانة المعدة والأمعاء ،

• ضيق التنفس ، ألم في الصدر ، التنفس بصفير، السعال (اضطرابات الجهاز التنفسي) ، انسداد الأنف.

• اضطرابات الدم المصحوبة بالحمى أو البرد و التهاب الحلق والقرحة في الفم أو الحلق.

• الحساسية

• فقدان الشهية

• العصبية ، صعوبة في النوم.

• الدوخة والنعاس واضطرابات التذوق والشعور بالوخز او التخدير.

• اضطرابات البصر

• اضطرابات الأذن

• الدوار (الإحساس بالدوخة)

• شنوذ في الإيقاع أو اضطراب معدل ضربات القلب (الخفقان).

• التوهج الساخن

• صعوبة في التنفس

• نزيف الأنف

• التهاب المعدة ، والإمساك ، الريح ، وعسر الهضم ، وصعوبة في البلع

• الشعور بالانتفاخ وجفاف الفم

• زيادة التحشؤ والقرحة في الفم وزيادة اللعاب ، أسهال.

• التهاب الكبد .

• طفح جلدي ، حكة ، القشعريرة (طفح القراص)

• التهاب الجلد ، الجلد الجاف ، زيادة التعرق

• التهاب العظام والمفاصل والعضلات، ألم في الظهر ، ألم في الرقبة. صعوبة و ألم مصاحب للبول ، ألم في الظهر العلوي (آلام الكلى)

• التهاب المهبلي غير المنتظم نزيف الحيض واضطرابات الخصية

• ألم في الصدر ، تورم ، شعور بتوعك ، الضعف والتعب

• تورم في الوجه واليدين والساقين و / أو القدمين ، الحمى والألم

• التغيرات في انزيمات الكبد و قيم الدم المختبرة.

نادر (قد يؤثر على شخص واحد من كل 1000 شخص):

• الهياج

• شعور بعدم واقعية الذات والشعور الخاص.

• تغيير لون الأسنان

• اضطراب وظائف الكبد ، واليرقان (مصفر تصبغ الجلد)

• احمرار وتقرح الجلد عندما تتعرض لأشعة الشمس.

غير معروف (لا يمكن تقدير المتوسط من البيانات المتاحة):

• اضطرابات الدم التي تتميز بحدوث نزيف غير عادي أو كدمات غير مسببة ، انخفاض في عدد كرات الدم الحمراء والتي تسبب حدوث تعب أو ضعف .

• العدوان ، والقلق ، والارتباك ، و توهم رؤية وسماع أشياء غير موجودة.

• الإغماء ، انخفاض الشعور باللمس ، فرط النشاط ، التغيير أو فقدان أسنشعار الشم ، وفقدان الشعور بالتذوق ، وهن عضلي الوهن (التعب والإرهاق في العضلات)

• اضطرابات السمع بما في ذلك الصمم و / أو رنين في الأذنين

• انخفاض ضغط الدم (الذي قد يرتبط مع الشعور بالضعف ، والإحساس بالإغماء والإغماء)

• تغير لون اللسان ، التهاب البنكرياس و الذى يتسبب في الشعور بالغثيان والقيء ، الأم في البطن ، وآلام الظهر .
• طفح مع ظهور البقع والبثور.

• ألم المفاصل

• مشاكل في الكلى.

شائع جدًا (قد يؤثر على أكثر من 1 من كل 10 أشخاص):

• إسهال

• وجع بطن

• الشعور بالمرض (غثيان)

• حدوث ريح (انتفاخ البطن)

• عدم ارتياح في البطن

• إسهال

شائع (قد يؤثر على ما يصل إلى شخص واحد من كل 10 أشخاص):

• قلة الشهية (فقدان الشهية)

• الشعور بالدوار

• صداع الراس

• الشعور بالوخز والتنميل أو تخدير.

• تغيرات في حاسة التذوق لديك (عسر الهضم)

• مشاكل بصرية

• الصمم

• طفح جلدي

• الحكّة (الحكة)

• ألم المفاصل (ألم مفصلي)

• إعياء

غير شائعة (قد يؤثر على شخص واحد من بين كل 100 شخص):

• انخفاض الشعور باللمس (نقص الحس)

• ضعف السمع أو الرنين في أذنيك

• شذوذ في إيقاع معدل ضربات القلب (الخفقان)

• مشاكل الكبد مثل التهاب الكبد

• بثور / نزيف في الشفاه والعينين والأنف و الفم والأعضاء التناسلية ، والتي قد تسببها متلازمة ستيفنز جونسون

• ردود فعل حساسية الجلد مثل الحساسية المصاحبة لأشعة الشمس ، الأحمر ، تقشر واحمرار وانتفاخ الجلد.

• الضعف (الوهن)

• الشعور العام بالتوعك (الشعور بالضيق)

الإبلاغ عن الآثار الجانبية

إذا كنت تعاني من أي آثار جانبية المذكورة فعليك بالتحدث إلى طبيبك أو الصيدلي. وهذا ايضا يشمل أي من الآثار الجانبية الغير المدرجة في هذه النشرة.

5- كيفية تخزين بادوزيثرو

يجب حفظ هذا الدواء بعيدا عن متناول يد الاطفال.

لا تستخدم هذا الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية المذكور على العبوة الكرتون والزجاجة .

قبل الفتح مسحوق: يحفظ في درجة حرارة لا تزيد عن 30 درجة مئوية في مكان جاف
بعد الحل: يحفظ في درجة حرارة لا تزيد عن 30 درجة مئوية في مكان جاف ويتم استخدامه خلال 3 أيام (معلق بادوثيزرو 15 مل) لا يجب
التخلص من أي أدوية عن طريق مياه الصرف الصحي أو النفايات المنزلية. اسأل الصيدلي كيفية التخلص من الأدوية التي لن تقوم باستخدامها
فيما بعد, فهذه التدابير سوف تساعد حماية البيئة.

6- محتويات العبوة وغيرها من المعلومات

كل 5 مل يحتوي علي :

- ما يعادل 200 مجم ازيثروميسين (209.6 مجم ازيثروميسين دايهيدرات)
- المكونات الأخرى :- السكروز ، هيدروكسي بروبيل السليلوز , فوسفات ثنائي القاعدية الصوديوم زنتان جم , نكهة الفانيليا ، نكهة الموز , كينولين اصفر .

العبوة

- عبوة كرتون تحتوي علي زجاجة بلاستيك شفافة بها 12.57 مجم من البودرة مع اثنين امبول بلاستيك كلا منهما يحتوي علي 4 ملي ماء معقمة لعمل 15 ملي معلق + غطاء مدرج+ نشرة داخلية

تصنيع بدر فارما للصناعات الدوائية