

بادوروم 100مجم/5ملل معلق

برجاء قراءة هذه النشرة بعناية قبل البدء بتناول الدواء .
احتفظ بهذة النشرة. يمكنك ان تقرأها مرة اخرى.
اذا زادت الاعراض الجانبية واصبحت خطيرة, او اذا لاحظت اي اعراض جانبية غير مذكورة في هذة النشرة
من فضلك اخبر الطبيب او الصيدلي.

في هذة النشرة:

- 1- ما هو بادوروم وفيما يستخدم؟
- 2- قيل اعطاء بادوروم
- 3- الاعراض الجانبية المحتملة
- 4- كيف يخزن بادوروم؟
- 5- معلومات اخرى

1- ما هو بادوروم وفيما يستخدم؟

هو 100 مجم/5 ملل محلول طارد للديدان المعوية واسع المدي.
-بادوروم يحتوي علي دواء يسمى ميبيندازول. وهي واحدة من مجموعة من الادوية تسمى " مضاد الديدان" .
ويستخدم معق بادوروم لعلاج اصابة الديدان في الامعاء مثل الديدان الدبوسية.
وغيرها من الالصابة بالديدان الشائعة مثل الديدان السوطية, والديدان المستديرة, الديدان الخطافية .

لوقف العدوي الي آخرين ولعائلتك أو إعادة لإصابة أنفسكم مرة اخرى , اتبع النصائح التالية لمدة ستة
أسابيع علي الأقل:

- إبقاء الاظافر قصيرة ز
- ارتداء ملابس داخلية في السرير0
- في الصباح, اغسل مؤخرتك جيدا.
- استخدام منشفة منفصلة لكل شخص في المنزل.
- قم بتغيير الملابس بانتظام
- قم بتنظيف أغطية السرير باستمرار
- غسل اليدين والاطافر بانتظام جيدا بعد استخدام المراض وقبل تناول الطعام.

2- قيل اعطاء بادوروم :

- لا تاخذ بادوروم اذا كان:
- لديك حساسية لاي من مكونات هذا الدواء.
- لا يستخدم للاطفال اقل من 4 سنوات.

استخدام عقاقير اخرى

يرجي إخبار الطبيب أو الصيدلي إذا كنت تأخذ أو اتخذت مؤخرا أي أدوية أخرى . وهذا يشمل الادوية التي
تشتريها بدون وصفة طبية والادوية العشبية والمكملات الغذائية أو الفيتامينات.
وعلي وجه الخصوص اخبر طبيبك أو الصيدلي إذا كنت تأخذ:
- ميترونيدازول : لبعض الأمراض المعدية.
- سيميبتدين : لعلاج حموضة المعدة الزائدة.
تحدث مع طبيبك قبل استخدام معلق بادوروم إذا كنت تأخذ أي من هذه الأدوية

الحمل والرضاعة :

يمنع البادوروم في فترة الحمل , وينبغي أن المرضى الذين يعتقدون أنهم قد تكون حاملان ان لا تأخذ هذا الدواء. كما انه غير معروف ما إذا كان تفرز مادة الميبيندازول في لبن الام, فإنه لا يوصي بالرضاعة الطبيعية عقب اخذ الدواء **القيادة واستخدام الآلات:** ليس من المحتمل أن تؤثر بادوروم علي القدرة علي القيادة أو استخدام أي أدوات أو آلات.

3- كيفية تناول بادوروم ؟

دائما تناول بادوروم تماما كما اخبرك الطبيب. عليك مراجعة الطبيب او الصيدلي للتأكد. **استخدام هذا الدواء**

- يؤخذ هذا الدواء عن طريق الفم.
- يعتمد الجرعة علي نوع الديدان المصاب بها.
- رج الزجاجة جيدا قبل الاستعمال.
- لا تحتاج إلي استخدام ملين أو تغيير النظام الغذائي الخاص بك.

. الجرعة .

الاطفال فوق الاربع سنوات والبالغين:

- 5×1 مل (1 كوب الجرعات). ومن المستحسن جدا أن يتم أخذ جرعة ثانية بعد 2 اسابيع, إذا استبه الإصابة مرة أخرى. إصابة الديدان الشائعة:
- 5×1 مل (1 كوب الجرعات) مرتين يوميا (صباحا ومساء) لمدة ثلاثة أيام أو كما وصفه الطبيب. طريقة الاستخدام : عن طريق الفم.

أعرض الجرعه الزائده:

في حالة زيادة العرضي, قد تحدث التقلصات المعوية, والغثيان, والتقيئ والاسهال.

العلاج:

لا يوجد ترياق محدد في غضون الساعة الاولي بعد الابتلاع, يتم عمل غسيل المعدة ويمكن اعطاء الفحم المنشط إذا كانت مناسبة.

إذا كنت تأخذ معلق بادوروم أكثر مما يجب

إذا كنت تأخذ معلق بادوروم أكثر مما يجب, تحدث الي طبيبك أو اذهب الي اقرب نستشفي قسم الطوارئ علي الفور.

إذا كنت قد نسيت أن تأخذ معلق بادوروم

لا تأخذ الجرعة المفقودة , خذ الجرعة التالية في الوقت المعتادة, ومن ثم الحفاظ علي أخذ الدواء الخاص بك كما وصفه الطبيب, لا تأخذ جرعة مضاعفة لتعويض الجرعة المفقودة. إذا كان لديك أي أسئلة أخرى عن استخدام هذا المنتج, إسأل طبيبك الخاص أو الصيدلي.

4- الآثار الجانبية الممكنة:

مثل جميع الأدوية, يمكن ان يتسبب بادوروم في آثار جانبية , علي الرغم من أنها لا تحدث مع الجميع. توقف عن استخدام الدواء وأخبر طبيبك فورا إذا لاحظت اي من هذه الآثار الجانبية الخاطيرة التالية. قد تحتاج إلي علاج طبي عاجل.

- تورم مفاجئ في الوجه أو الحلق, ارتيكاريا, تهيج شديد, احمرار أو ظهور تقرحات في الجلد. قد تكون هذه علامات لحدوث رد فعل حساسية شديد.
- ظهور تقرحات في البشرة والفم والعينين والأعضاء التناسلية.
- تشنجات.

إخبر طبيبك أو الصيدلي إذا لاحظت أي من الآثار الجانبية التالية:

الشائع (تؤثر علي أقل من فرد كل 10 أفراد)

- ألم في البطن
الغير شائع (تؤثر علي أقل من فرد كل 100 فرد)

- ألم في البطن

- إسهال

- انتفاخ البطن. ريج.

النادر (تؤثر علي أقل من كل 1000 فرد)

- طفح

- التهاب الكبد الوبائي

- تغير في انزيمات الكبد (موضحة في اختبارات الدم), مما يجعلك عرضي اكثر للعدوي.

- سقوط الشعر

- دوخة

- إذا حدثت لك آثار جانبية وزادت خطورتها او اذا لاحظت أي آثار جانبية غير مدرجة في هذه النشرة, يرجى

إخبار الطبيب أو الصيدلي.

5-كيف يتم تخزين بادوروم:

يحفظ بعيدا عن متناول الاطفال

لا يستخدم بادوروم بعد تاريخ الصلاحية المدون علي العبوة الخارجية.

يحفظ في درجة حرارة لا تزيد عن 30 درجة مئوية في مكان جاف.

6-معلومات اخري

ماذا يحوي بادوروم :

المواد الفعالة:

ميبيندازول 100 مجم

المواد الغير فعالة: الايروسول، سوربيتول، الجليسرين، سوربات البوتاسيوم، ميثاييل بارابين صوديوم، بروبايل بارابين

صوديوم، سكري الصوديوم، وكربوكسي ميثيل سلولوز، حمض الستريك اللامائية،ثنائي كبريتات الصوديوم ،

بوليسوربات 80، نكهة الموز، بروبيلين جليكول، والمياه النقية.

محتويات عبوة بادوروم:

علبة كرتون تحتوي على زجاجة 30 مللي بني من النوع الثاني و غطاء الومنيوم والنشرة الداخلية.

انتاج شركة بدر فارما للصناعات الدوائية