

بدرميزون 8 مجم / 2ملي
محلول للحقن العضلي / والوريدي

- اقرأ كل هذه النشرة بعناية قبل إعطائك هذا الدواء لأنه يحتوي على معلومات مهمة لك.
- احتفظ بهذه النشرة. قد تحتاج إلى قراءته مرة أخرى.
 - إذا كان لديك أي أسئلة أخرى ، اسأل طبيبك أو الصيدلي أو الممرضة.
 - إذا كنت تعاني من أي آثار جانبية ، فتحدث إلى طبيبك أو الصيدلي أو الممرضة . وهذا يشمل أي آثار جانبية محتملة غير مدرجة في هذه النشرة.

ماذا يوجد في هذه النشرة

1. ما هو بدرميزون وما الذي يستخدم من أجله
2. ما تحتاج إلى معرفته قبل أن يتم إعطاؤك بدرميزون
3. كيف يتم إعطاء بدرميزون
4. الآثار الجانبية المحتملة
5. كيفية تخزين بدرميزون
6. محتويات الحزمة وغيرها من المعلومات

1. ما هو بدرميزون وما الذي يستخدم من أجله

ديكساميثازون هو جلايكورتيكويد اصطناعي (هرمون قشر الكظر).

ديكساميثازون ينتمي إلى مجموعة من الأدوية تسمى المنشطات.

يتم إعطاء هذا الدواء عن طريق الحقن للمرضى غير القادرين على تناول شكل قرص من الدواء . ديكساميثازون يقلل من الالتهاب ويثبط الجهاز المناعي ويستخدم بشكل طبيعي للمرضى الذين يعانون من:

- ردود الفعل التحسسية الشديدة التي تسبب تورم الوجه والحنك وانخفاض ضغط الدم والانهيار (وذمة وعائية عصبية والحساسية المفرطة)
- الصدمة الناجمة عن العدوى أو السل الحاد (أيضا مع العلاجات المضادة للعدوى على سبيل المثال المضادات الحيوية)

• ارتفاع الضغط في الجمجمة الناجم عن الأورام أو التشنجات الطفولية (اضطراب النوبات عند الأطفال)

• في بعض الأحيان ، يتم إعطاء الحقن في المنطقة المؤلمة نفسها على سبيل المثال التهاب المفاصل (التهاب المفاصل الروماتويدي وهشاشة العظام)

يستخدم بدرميزون كعلاج لمرض فيروس كورونا -19 في المرضى البالغين والمراهقين (الذين تتراوح أعمارهم بين 12 سنة وما فوق مع وزن الجسم 40 كجم على الأقل) مع صعوبة في التنفس والحاجة إلى العلاج بالأكسجين .

يمكن أيضا إعطاء بدرميزون في بعض الأحيان عن طريق الحقن تحت الجلد (تحت الجلد) لتخفيف بعض الأعراض بما في ذلك الألم والتعب وفقدان الوزن والشعور و كوندك مريضا .

2. ما تحتاج إلى معرفته قبل أن يتم إعطاؤك بدرميزون

يجب ألا تعطى بدرميزون

إذا كان لديك أي من الحالات التالية :

- إذا كنت حساسا أو حساسا ديكساميثازون فوسفات أو أي من المكونات الأخرى لهذا الدواء
- إذا كان لديك عدوى فطرية انتشرت لتشمل الجسم كله .
- إذا كان لديك أي عدوى أخرى واسعة الانتشار لا يتم علاجها حاليا.
- إذا كنت تريد أن يتم تطعيمك بلقاحات الفيروسات الحية .
- العدوى في موقع الحقن ، وخاصة في المفصل حيث سيتم حقن ديكساميثازون فوسفات (إلا إذا كنت تتناول المضاد الحيوي المناسب).
- المفاصل غير المستقرة (هذه حالة يمكن أن تفسح فيها المفاصل ، مثل الركبة ، المجال فجأة) ، حيث سيتم حقن بدرميزون .
- قرحة المعدة.
- السل النشط .
- الذهان الحاد (شكل من أشكال الحالة العقلية).
- لديك حساسية شديدة من الكبريتيت.

التحذيرات والاحتياطات

يحتوي على (ميتابيسلفيت الصوديوم) ، التي قد تسبب تفاعلات من نوع الحساسية بما في ذلك أعراض الحساسية و نوبات الربو التي تهدد الحياة أو أقل شدة لدى بعض الأشخاص المعرضين للإصابة اشخاص. تُلاحظ حساسية الكبريتات بشكل متكرر في المصابين بالربو عنها في الناس غير الربو ".

- تحدث إلى طبيبك أو ممرضتك قبل إعطائك بدميزون:
 - إذا كنت قد أصبت في أي وقت مضى باكتئاب حاد أو اكتئاب هوسي (اضطراب ثنائي القطب). وهذا يشمل الإصابة بالاكتئاب من قبل أثناء تناول أدوية الستيرويد مثل ديكساميثازون.
 - إذا كان أي من أفراد عائلتك المقربين قد أصيب بهذه الأمراض.
 - إذا كان لديك أو يشنبه في إصابتك بوزم القوائم (ورم في الغدد الكظرية).
 - إذا كان أي من هذه تنطبق عليك، تحدث إلى الطبيب قبل تلقي ديكساميثازون.
- مشاكل الصحة العقلية أثناء تناول ديكساميثازون
- يمكن أن تحدث مشاكل الصحة العقلية أثناء تناول المنشطات مثل ديكساميثازون
- هذه الأمراض يمكن أن تكون خطيرة.
 - عادة ما تبدأ في غضون بضعة أيام أو أسابيع من بدء الدواء.
 - من المرجح أن تحدث بجرعات عالية .
 - تختفي معظم هذه المشاكل إذا تم تخفيض الجرعة أو إيقاف الدواء . ومع ذلك ، إذا حدثت مشاكل ، فقد يحتاجون إلى علاج.
- تحدث إلى الطبيب إذا كنت (أو أي شخص يتناول هذا الدواء) ، تظهر أي علامات على وجود مشاكل في الصحة العقلية .
- هذا مهم بشكل خاص إذا كنت مكتئبا ، أو قد تفكر في الانتحار. في حالات قليلة ، حدثت مشاكل في الصحة العقلية عندما يتم تخفيض الجرعات أو إيقافها.
- يجب تجنب أي تعرض للأمراض المعدية . إذا لم يكن لديك تاريخ محدد من جذري الماء ، يجب تجنب أي اتصال مع جذري الماء (الهربس البسيط) ، القوباء المنطقية (الهربس النطاقي) أو الحصبة. ينطبق هذا الاحتياط أيضا إذا كان طفلك هو المريض الذي يعالج بهذا الدواء. إذا كنت تعتقد أنك قد تعرضت لهذه ، يرجى طلب المشورة من الطبيب على الفور لأن العواقب يمكن أن تكون خطيرة (المنشطات) يمكن أن يمنع جسمك من الدفاع عن نفسه ضد هذه الأمراض التي يمكن أن تصبح شديدة واسعة الانتشار). إذا أصبت بهذه العدوى، فستحتاج إلى علاج فوري في المستشفى.
- إذا كنت تعالج من كارونا-19 ، فيجب ألا تتوقف عن تناول أي أدوية ستيرويد أخرى ما لم يأمرك طبيبك بذلك
- تحدث إلى طبيبك أو الصيدلي أو الممرضة قبل تناول بدميزون. الاحتياطات العامة المتعلقة باستخدام الستيرويد في أمراض محددة ، وإخفاء العدوى ، والأدوية المصاحبة وما إلى ذلك بما يتماشى مع التوصيات الحالية .
- قد تخفي الكورتيكوستيرويدات بعض علامات العدوى وقد تظهر عدوى جديدة أثناء استخدامها . سيجاول أطباؤك استخدام أصغر جرعة ضرورية لمساعدتك . ومع ذلك ، قد تكون هناك أوقات تكون فيها هناك حاجة إلى زيادة الجرعة . أي تخفيض في الجرعة يجب أن يتم ببطء أكثر من الزيادة .
- سيشرح لك طبيبك ذلك ومن المحتمل أن يعطيك "بطاقة علاج الستيرويد " لإظهارها للأطباء الآخرين أثناء حاجتك إلى تناولها المنشطات (بما في ذلك عن طريق الفم).
- قد تكون بطاقات العلاج بالستيرويد متاحة أيضا من الصيدلي الخاص بك .
- في بعض الأحيان قد يعطيك جسمك "آثار انسحاب " بعد تناول المنشطات أو أثناء تقليل الجرعة ، بما في ذلك الحمى والتعب والأوجاع والآلام في العضلات والمفاصل . يجب عليك إخبار طبيبك إذا كنت تعاني من مثل هذه الأعراض على الرغم من أنه قد تكون هناك أسباب أخرى لهذه الأعراض .
- يمكن أن تؤدي الكورتيكوستيرويدات إلى ارتفاع ضغط الدم وتورم الكاحل (عن طريق الاحتفاظ بالملح) وفقدان من البوتاسيوم في الماء الخاص بك . سيراقب طبيبك حالتك ويعالجها إذا نشأت . تستخدم المنشطات أيضا بحذر ، حتى لو لزم الأمر ، إذا كان المريض الذي يتناولها يعاني من نوبة قلبية .
- يمكن أن تكون تأثيرات الكورتيكوستيرويدات أكبر في المرضى الذين يعانون من قصور الغدة الدرقية (عندما لا تنتج الغدة الدرقية ما يكفي من هرمون الغدة الدرقية) أو تليف الكبد (تندب خطير في الكبد) وقد يحتاج طبيبك ضبط الجرعة.
- العلاج مع هذا الدواء قد يسبب أزمة ورم القوائم، والتي يمكن أن تكون قاتلة. ورم القوائم هو ورم نادر في الغدد الكظرية. يمكن أن تحدث أزمة مع ما يلي
- الأعراض: الصداع والتعرق والخفقان وارتفاع ضغط الدم. اتصل بطبيبك على الفور إذا واجهت هذه العلامات.
- يجب عليك أيضا إخبار الطبيب إذا كنت:
- يعانون من قصور القلب أو أصيبوا بنوبة قلبية مؤخرا
 - يعانون من ارتفاع ضغط الدم
 - يعانون من مشاكل في الكلى أو الكبد

- يعاني من مرض السكري أو أحد الأقارب مصاب بمرض السكري
- يعانون من أو لديهم قرحة في المعدة أو الاثني عشر
- يعانون من هشاشة العظام (ترقق وضعف العظام)
- عانيت من ضعف العضلات مع هذا المنشطات أو غيرها في الماضي
- يعانون من الوهن العضلي الوبيل (مرض يسبب ضعف العضلات)
- تعاني من عدوى العين بفيروس الهربس
- يعانون من الجلوكوما (زيادة الضغط داخل العين) أو أحد الأقارب لديه الجلوكوما
- يعانون من الصرع
- يعانون من الفصام
- سبق أن أصبت بالسل
- سبق أن أصبوا بداء الأميبات (عدوى خاصة بالبلدان المدارية وتسبب الإسهال)
- لديك أعراض متلازمة تحلل الورم مثل تشنج العضلات وضعف العضلات والارتباك وفقدان البصر أو الاضطرابات وضيق التنفس ، في حالة كنت تعاني من ورم خبيث دموي .

إذا تم إعطاء جرعات عالية من هذا الدواء ، فقد ينصح بتقليل تناول الملح وتناول البوتاسيوم الإضافي في شكل أقراص. في حالة الحقن الموضعي بدرميزون (مثل الحقن في المفصل) ، سيأخذ طبيبك عناية خاصة لتقليل الخطر المعين من العدوى البكتيرية . لا ينبغي حقن هذا الدواء مباشرة في موقع مصاب . يرجى إخبار طبيبك إذا كنت تعاني من مضاعفات مثل زيادة ملحوظة في الألم يرافقه تورم موضعي ، مزيد من تقييد حركة المفاصل ، حمى أو توعك بعد الحقن الموضعي لهذا الدواء. سيتعين على طبيبك التحقق إذا كنت تعاني من تسمم الدم واتخذ الإجراء المناسب.

- يجب تجنب الحقن في المفاصل غير المستقرة.
- يرجى العلم بعدم الإفراط في استخدام المفاصل التي لا تزال مريضة ، حتى لو كنت لا تعاني من الألم!
- إذا تعرضت لحادث أو مرضت أو احتجت إلى أي عملية جراحية (بما في ذلك عند طبيب الأسنان) أو كنت ستحصل على أي لقاحات (خاصة مع ما يسمى "لقاحات الفيروسات الحية") أثناء أو بعد العلاج بدرميزون ، يجب عليك إخبار الطبيب المعالج كنت تتناول أو تناولت المنشطات.

يجب أن يحمل جميع المرضى الذين يتناولون أدوية الستيرويد لأكثر من بضعة أيام بطاقات "علاج الستيرويد" ، والتي تتوفر من طبيبك أو الصيدلي. تحمل هذه البطاقات تفاصيل عن دوائك وطبيبك.

أطفال

إذا كان المريض طفلاً ، فسوف يقوم الطبيب بمراقبة النمو والتطور على فترات أثناء العلاج لأن هذا الدواء يمكن أن يسبب تأخر النمو. سيقصر العلاج ، ان أمكن ، على جرعة واحدة في أيام بديلة.

الأطفال المبتسرين لا ينبغي استخدام الديكساميثازون بشكل روتيني عند الخدج المصابين بمشاكل في الجهاز التنفسي.

إذا تم إعطاء ديكساميثازون لطفل مولود قبل الأوان ، فيجب مراقبة وظيفة القلب .

أدوية أخرى ودرميزون

أخبر طبيبك أو الصيدلي إذا كنت تتناول أو تناولت مؤخرًا أو قد تتناول أي أدوية أخرى ، بما في ذلك الأدوية التي تم الحصول عليها بدون وصفة طبية.

هذا مهم بشكل خاص مع الأدوية التالية لأنها قد تتفاعل مع بدرميزون:

- الأسبرين أو الأدوية المماثلة
- الفينيتوين (يستخدم لعلاج الصرع)
- الباربيتورات (الأدوية المهدئة التي تستخدم لعلاج الأرق والصرع)
- الايفيردين (لتسكين احتقان الأنف)
- مضادات حيوية تسمى ريفامبيسين وريفابوتين (تستخدم لعلاج السل)
- كاربامازيبين (يستخدم لعلاج الصرع والألم والاكتئاب الهوسي)
- أمينوغلوثيثيميد (دواء مضاد للسرطان)
- الأدوية المضادة للتخثر التي تسبب الدم على سبيل المثال. الوارفارين
- أدوية السكري
- بعض مدرات البول (أقراص الماء) - الأدوية التي تزيد من إنتاج البول
- الأدوية المضادة للفيروسات القهقرية ، مثل ريتونافير ودارونافير وإندينافير ولوبينافير وسكوبينافير وإيفافيرينز

بسبب التفاعلات مع هذه الأدوية ، قد يضطر طبيبك إلى تعديل جرعة الدواء الممنوح لك. قد تزيد بعض الأدوية من تأثير بدرميزون وقد يرغب طبيبك في المراقبة

أنت بحذر إذا كنت تتناول هذه الأدوية (بما في ذلك بعض الأدوية المضادة لفيروس نقص المناعة البشرية: ريتونافير ، كوبيسيستات). إذا كنت تتناول بعض مضادات التخثر (أدوية لمنع تجلط الدم) في نفس الوقت الوقت ، سيقوم طبيبك بفحص تجلط الدم بشكل متكرر ، لتقليل فرصة النزيف.

الحمل والرضاعة

أخبر طبيبك أو ممرضتك قبل إعطائك هذا الدواء إذا كنت حاملاً أو مرضعة. سيقدر الطبيب بعد ذلك ما إذا كانت الحقنة مناسبة لك. عندما يتم إعطاء الديكساميثازون لفترات طويلة أو بشكل متكرر أثناء الحمل ، فقد يكون هناك خطر متزايد لتخلف النمو لدى الطفل الذي لم يولد بعد. قد يعاني الأطفال حديثو الولادة من الأمهات اللاتي تلقين ديكساميثازون قرب نهاية الحمل من انخفاض مستويات السكر في الدم بعد الولادة.

إذا كنت تتناول جرعات عالية من هذا الدواء لفترات طويلة وكنت مرضعة ، فقد يتناول طفلك ديكساميثازون من خلال حليب الثدي. سيراقب طبيبك هذا.

السياقة واستعمال الماكينات

لا تقود السيارة أو تستخدم الآلات إذا كنت متأثراً بإعطاء هذا الدواء.

يحتوي ديكساميثازون فوسفات نوريديم على الصوديوم

يحتوي هذا الدواء على 241.5 مجم صوديوم (المكون الرئيسي للطبخ / ملح الطعام) لكل جرعة مفردة كحد أقصى. هذا يعادل 12.075% من الحد الأقصى الموصى به من المدخول الغذائي اليومي من الصوديوم لشخص بالغ.

3. كيف يتم إعطاء بدميزون

ستعطيك ممرضتك أو طبيبك الحقنة. سيجدد طبيبك الجرعة الصحيحة لك وكيف ومتى سيتم إعطاء الحقنة. خذ بدميزون فقط كما هو موصوف من قبل طبيبك. سيقدر طبيبك المدة التي يجب أن تتناول فيها ديكساميثازون . استشر طبيبك أو الصيدلي إذا لم تكن متأكدًا.

علاج كارونا-19

ينصح المرضى البالغين بإعطاء 6جم عن طريق الحقن الوريدي مرة في اليوم لمدة تصل إلى 10 أيام. استخدم في المراهقين

ينصح مرضى الأطفال (المراهقون بعمر 12 عامًا أو أكبر) بإعطاء 6 مجم عن طريق الحقن الوريدي مرة واحدة يوميًا لمدة تصل إلى 10 أيام.

إذا تم إعطاؤك ديكساميثازون فوسفات أكثر مما يجب أو إذا فاتتك جرعة

نظرًا لأن الطبيب أو الممرضة ستعطيك الحقنة ، فمن غير المحتمل أن يتم إعطاؤك أكثر من اللازم أو أن تفوتك جرعة. إذا كنت قلقًا ، تحدث إلى طبيبك أو ممرضتك.

إذا توقفت عن العلاج ببدميزون

قد يكون من الخطر إيقاف علاجك ببدميزون فجأة.

بعد العلاج المطول ، قد يكون جسمك قد اعتاد على إدارة هذا الدواء وربما قلل من الإنتاج الطبيعي من الهرمونات مثل التي يحتويها هذا الدواء.

ستعتمد طريقة إيقاف العلاج على المرض الذي تعالج منه ومقدار بدميزون الذي تم إعطاؤه لك.

قد يكون من الضروري تقليل كمية بدميزون التي يتم إعطاؤها لك تدريجيًا حتى تتوقف عن تناولها تمامًا. يجب أن يتأكد طبيبك من أن المرض الذي عولجت منه من غير المرجح أن ينعكس. يجب تعديل تقليل الجرعة إذا كنت تتعرض لضغط غير عادي (مثل مرض آخر أو صدمة أو إجراءات جراحية).

عندما يتم إيقاف العلاج بسرعة كبيرة ، قد تحدث أعراض الانسحاب مثل الحمى وآلام العضلات وآلام المفاصل والتعب. يمكن أن يؤدي الانخفاض السريع جدًا بعد العلاج المطول إلى قصور في إنتاج الهرمون في الغدة الكظرية وانخفاض ضغط الدم (يمكن أن تكون أعراضه التعب والدوخة والصداع والخفقان). في الحالات القصوى ، قد يكون هذا مميتًا.

في حالات قليلة ، تحدث مشاكل الصحة العقلية عند خفض الجرعات أو إيقافها .

أخبر طبيبك على الفور إذا كنت تعاني من أي أعراض انسحاب.

إذا كان لديك أي أسئلة أخرى حول استخدام هذا الدواء ، اسأل طبيبك أو الصيدلي أو الممرضة.

4. الآثار الجانبية المحتملة

مثل جميع الأدوية ، يمكن أن يسبب هذا الدواء آثارًا جانبية ، على الرغم من عدم حدوثها لدى الجميع. يمكن أن تحدث بعض الآثار الجانبية على الفور بينما قد يستغرق البعض الآخر أسابيع أو شهور.

إذا شعرت بتوسعك بأي شكل من الأشكال ، فاستمر في تلقي الدواء ، لكن استشر طبيبك على الفور. إذا واجهت أيًا مما يلي ، فيرجى الاتصال بطبيبك على الفور حيث قد تحتاج إلى عناية طبية عاجلة:

• رد فعل تحسسي قد يشمل طفح جلدي مفاجئ وحكة وتورم في

الأطراف المتطرفة (مثل اليدين والقدمين) وانتفاخ الفم والحلق (مما قد يسبب صعوبة في التنفس

- إذا كنت تعاني من تأثيرات مفاجئة و (في حالات العلاج طويل الأمد) غير عادية مثل الشعور بالإغماء والنزيف ،ضعف شديد ، أو ألم مفاجئ في أي من أعضائك ،
- تم الإبلاغ عن الآثار الجانبية التالية غير المرغوب فيها للديكساميثازون وهي مدرجة أدناه وفقاً للأعضاء المصابة.
- الاضطرابات النفسية (مشاكل الصحة العقلية)
- يمكن أن تسبب المنشطات بما في ذلك الديكساميثازون مشاكل صحية عقلية خطيرة.
- هذه شائعة في كل من البالغين والأطفال. يمكن أن تؤثر على حوالي 5 من كل 100 شخص يتناولون أدوية مثل ديكساميثازون.
- الشعور بالانكئاب ، بما في ذلك التفكير في الانتحار.
- الشعور بالاننشء (الهوس) أو الحالة المزاجية التي ترتفع وتنخفض.
- الشعور بالقلق ومشاكل النوم وصعوبة التفكير أو التشوش وفقدان الذاكرة.
- الشعور أو الرؤية أو سماع أشياء غير موجودة. وجود أفكار غريبة ومخيفة أو تغيير طريقة تصرفك أو الشعور بالوحدة.

إذا لاحظت أيًا من هذه المشاكل ، تحدث إلى الطبيب على الفور.

يجب على مقدمي الرعاية للمرضى الذين يتلقون بدميزون التحدث إلى الطبيب على الفور إذا أظهر المريض أي علامات لمشاكل الصحة العقلية. هذا مهم بشكل خاص إذا كان المريض يبدو مكتئبًا أو ذكر أفكارًا عن الانتحار. إذا كنت تعاني من مرض انفصام الشخصية أو الصرع فقد تتفاقم أعراضك.

الالتهابات والاصابات

قد تعاني من التهابات أكثر تواترًا وشدة دون ملاحظة الأعراض بالإضافة إلى الالتهابات الانتهازية (التي تسببها عادة الكائنات الحية الدقيقة غير الضارة في حالة ضعف الجهاز المناعي) أو تكرار الإصابة بالسلل الخامل.

نمو غير طبيعي للأنسجة

قد تصاب بخراجات معقمة (مجموعات مغلقة من القيح ، من المحتمل أن تتحول إلى كتل صلبة صلبة لأنها ندبة).

أنظمة الدم

قد يكون هناك زيادة غير طبيعية في عدد خلايا الدم البيضاء.

الهرمونات (اضطرابات الغدد الصماء) عدم انتظام الدورة الشهرية ، قلة الدورة الشهرية ، نمو الشعر غير الطبيعي ، تطور حالة كوشينغويد (تشمل أعراضها السمنة المركزية مع نحافة الأذرع ، وترقق الجلد مع سهولة الكدمات ، وهزال العضلات وضعفها ، وارتفاع ضغط الدم ، وسكر الدم غير المنضبط ، وهشاشة العظام).

قد يكون الأطفال والمراهقون قد أعاقوا النمو. قد تقل استجابتك للإجهاد الناجم عن الصدمة أو الجراحة أو المرض. قد تواجه أيضًا نقصًا في تحمل الكربوهيدرات ، وظهور داء السكري الكامن ، وزيادة الحاجة إلى الأنسولين أو الأدوية الأخرى إذا كنت مصابًا بداء السكري.

اضطرابات التمثيل الغذائي والتغذية

قد تلاحظ زيادة الوزن أو زيادة الشهية. قد يواجه جسمك أيضًا صعوبة في التعامل مع النيتروجين أو الكالسيوم أو الصوديوم أو البوتاسيوم بشكل مناسب.

اضطرابات الجهاز العصبي

قد تشعر بزيادة الضغط في رأسك مع ضعف في الرؤية ، أو دوام ، أو صداع ، أو عند الرضع الخدج ، وقد يحدث شلل دماغي (تشوه في الدماغ).

اضطرابات العين

قد تصاب بإعتام عدسة العين أو تشعر بضغط متزايد في العين أو تلاحظ انتقالًا غير طبيعي من مقل العين أو ترقق القرنية أو الغلاف الخارجي الأبيض لمقلة العين. قد تصبح رؤيتك مشوشة بسبب احتقان القرص البصري أو الجلوكوما مع احتمال تلف الأعصاب البصرية. يمكن أن تحدث التهابات العين الثانوية بسبب الفطريات أو الفيروسات كما يمكن أن تحدث حالات نادرة من العمى المرتبطة بالعلاج الموضعي حول الوجه والرأس. يمكن للأطفال الخدج

يعانون من اعتلال الشبكية. قد تصاب أيضًا باضطرابات بصرية أو فقدان الرؤية (اعتلال المشيمية والشبكية).

اضطرابات الأوعية الدموية أو القلب

ارتفاع ضغط الدم ، جلطات دموية في الأوردة. قد يصاب المرضى المعرضون للإصابة بفشل القلب ، أو قد تتمزق أنسجة القلب بعد نوبة قلبية حديثة. قد يحدث مرض عضلة القلب (اعتلال عضلة القلب الضخامي) عند الرضع الذين يعانون من انخفاض الوزن عند الولادة.

إذا تم علاجك من الورم النقوي المتعدد باستخدام ديكساميثازون بالاشتراك مع ليناليدوميد أو ثاليدوميد ، فستكون لديك مخاطر متزايدة من حالات الانصمام الخثاري بما في ذلك: تجلط الأوردة العميقة (جلطة دموية في أوردة ساقك) - من أعراض هذا ألم الساق ؛ الانصمام الرئوي (جلطة دموية في الشرايين المؤدية إلى رئتيك) - من أعراض هذا الشعور بألم في الصدر أو ضيق في التنفس. التردد "غير معروف": سماكة عضلة القلب (اعتلال عضلة القلب الضخامي) عند الأطفال المولودين قبل الأوان ، والتي تعود بشكل عام إلى طبيعتها بعد التوقف عن العلاج.

اضطرابات في المعدة أو الجهاز الهضمي

قد تعاني من الغثيان والقيح في المعدة أو ارتجاع أو عدوى أو التهاب في الأنبوب الذي يؤدي إلى معدتك. قد تحدث القرحة الهضمية

مع احتمال حدوث نزيف أو انتقاب في الأمعاء الدقيقة والغليظة (خاصة إذا كان لديك مرض التهاب الأمعاء). قد يلتهب البنكرياس (التهاب البنكرياس) أو قد تنتفخ معدتك.

أمراض جلدية قد يصبح جلدك رقيقاً أو هشاً مع وجود بقع حمراء أو دموية أو كدمات أو قد يصبح أفتح أو أغمق (نقص أو فرط تصبغ). قد يصبح وجهك أحمر بشكل غير عادي أو قد يكون لديك حب الشباب وتورم حول العينين والفم واليدين وخلايا النحل والتهاب الجلد التحسسي أو علامات التمدد.

قد تستغرق الجروح وقتاً أطول للشفاء ، وقد تتأثر اختبارات الجلد وقد تتعرق أكثر. بعد الحقن في الوريد قد تشعر بحرقة أو وخز خاصة في منطقة العجان (الجلد بين فتحة الشرج والأعضاء التناسلية).

اضطرابات العضلات والعظام

قد تعاني من ضعف العضلات ، فقدان الكتلة العضلية ، هشاشة العظام (فقدان كثافة العظام) خاصة إذا كنت في سن اليأس. كسور ضغط العمود الفقري (انهيار عظم في العمود الفقري) ، تنخر معقم لرأس الفخذ والعضد (مشكلة شديدة في الركبة ومفصل الورك ، ربما تتطلب مفاصل بديلة) ، كسر في العظام الطويلة ، تمزق الأوتار ، توهج ما بعد الحقن (بعد الحقن الموضعي) على سبيل المثال في المفصل).

الجهاز التناسلي

قد يتأثر عدد ونشاط الحيوانات المنوية عند الرجال.

الاضطرابات العامة

قد يكون لديك شعور عام بالمرض.

العديد من هذه الآثار الجانبية خطيرة ، لذا يرجى إخبار طبيبك بأعراضك في أسرع وقت ممكن.

يرجى ملاحظة أنه من المهم جداً ألا تتوقف فجأة عن تناول هذا الدواء (حتى إذا كنت تعاني من عرض جانبي) ما لم يخبرك طبيبك بذلك إذا كنت تعتقد أن هذا الحقن يسبب لك أي مشاكل ، أو كنت قلقاً على الإطلاق ، تحدث إلى طبيبك أو ممرضتك أو الصيدلي.

التبليغ عن الأعراض الجانبية

إذا عانيت من أي آثار جانبية ، فتحدث إلى طبيبك أو الصيدلي أو الممرضة. يتضمن ذلك أي آثار جانبية محتملة غير مذكورة في هذه النشرة. يمكنك أيضاً الإبلاغ عن الآثار الجانبية مباشرة عبر

أبلغ عن الأعراض الجانبية عبر البريد الإلكتروني: pv.followup@edaegypt.gov.eg

5. كيفية تخزين بدميزون

احفظ هذا الدواء بعيداً عن أنظار ومتناول أيدي الأطفال.

يخزن في درجة الحرارة لا تزيد عن 30 درجة مئوية.

لا تتلج ولا تجمد. احتفظ بالقارورة في علبة الكرتون الخارجية لحمايتها من الضوء.

لا تستخدم هذا الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية المدون على الكرتون والقارورة. يشير تاريخ انتهاء الصلاحية إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.

لا تتخلص من الأدوية في مياه الصرف الصحي أو النفايات المنزلية. اسأل الصيدلي عن كيفية التخلص من الأدوية التي لم تعد تستخدمها. ستساعد هذه الإجراءات في حماية البيئة.

6. محتويات العبوة ومعلومات أخرى

المادة الفعالة هي فوسفات ديكساميثازون.

علبة كرتون تحتوي علي فيال زجاج شفاف (نوع I) بها 2 ملي من محلول للحقن العضلي/الوريدي مغلقة بغطاء مطاطي وغطاء الامونيوم مع نشرة داخلية

المكونات الأخرى :- هي كبريتات الصوديوم ، ، وسيترات الصوديوم اللامائية ، وهيدروكسيد الصوديوم والماء للحقن .

تصنيع شركة بدر فارما للصناعات الدوائية

صاحب الرخصة: مصنع بدر فارما للصناعات الدوائية